

В августе опасность болезней и вредителей плодовых деревьев все еще не миновала.

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 23.08.2018 Брой: 8/2018



Для сортов яблони, восприимчивых к мучнистой росе, борьба с этим заболеванием также продолжается. Для одновременной борьбы с паршой лучше всего использовать фунгициды, эффективные против обоих патогенов. Сорта, устойчивые к парше – Прима, СООР-10, Фролина, Либерти, Джонафри, Джонатан, Пионер, Макфри, Пилот, Топаз, Новамак, Сава, Рубинола и др., опрыскивают только против мучнистой росы.

В августе также проводят обработки против горькой ямчатости /пятнистости/ у яблони. Повреждения от этого неинфекционного расстройства наблюдаются в период созревания и позже, во время хранения. Пораженные плоды усеяны многочисленными темными вдавленными пятнами, которые чаще всего

сосредоточены в нижней части плода. Позже они становятся более интенсивно окрашенными; у плодов красной окраски они приобретают темно-красный цвет, а у желтых и зеленых плодов становятся светло-зелеными до зеленых. Иногда пораженные яблоки не проявляют внешних симптомов и не отличаются от здоровых, но при разрезании видны коричневые ямки, разбросанные среди здоровой мякоти. Горькая ямчатость состоит из темно-коричневой губчатой ткани с горьким вкусом. Для предотвращения этого расстройства проводят две-три обработки CaCl_2 - 0,6 %. Первое опрыскивание проводят примерно за месяц до сбора урожая, а последующие — с интервалом 10-12 дней. Также рекомендуется листовое удобрение Вуксал Кальций – 300-600 мл/да. С ним проводят минимум 6 опрыскиваний, первое — после завязывания плодов, а последующие — с интервалом 12-15 дней. Необходимо избегать водного стресса у деревьев, а сбор урожая следует проводить в наиболее благоприятные сроки для каждого сорта.

В первой половине августа продолжается борьба со вторым поколением яблонной плодовой жорки.

Меры защиты растений еще предстоит принять на груше, вишне, персике и землянике.

В органическом производстве использование синтетических пестицидов не допускается. Для борьбы с грибными болезнями применяют медьсодержащие и серосодержащие фунгициды. Для борьбы с яблонной и восточной плодовой жоркой разрешены Мадекс Топ и Мадекс Твин – 10 мл/да, а также диспенсеры – РАК 3+4 для яблонной плодовой жорки и РАК 5+6 и ФЕРОКОН АМ для восточной плодовой жорки. Натуралис ОД включен в перечень для борьбы с грушевой медяницей.

Для борьбы с яблонной минирующей молью эффективным биоинсектицидом является Ним Азал Т/С – 300 мл/да.

Синеис 480СК разрешен к применению на: землянике против трипсов; абрикосе, персике и нектарине против персиковой плодовой жорки; груше против грушевой медяницы; и яблоне против яблонной плодовой жорки и яблонной минирующей моли.

Информацию о средствах защиты растений, разрешенных против различных болезней и вредителей в августе, можно найти в выпуске 7/2018 журнала «Защита растений».