

# Грушевый почковый долгоносик наносит серьезный ущерб не только груше

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 09.10.2018 Брой: 10/2018



Грушевый почковый долгоносик (*Anthonomus rugi* Kollar) широко распространен по всей стране и наносит серьезный ущерб не только груше, но также яблоне, абрикосу и сливе.

Вредитель представляет собой небольшого долгоносика, развивающего одно поколение в год. Он откладывает яйца в почки груши осенью и зимует там в стадии яйца. Вылупившиеся весной личинки полностью повреждают плодовые почки, в результате чего из них не развивается ни одного цветка. Поврежденные плодовые почки не развиваются во время цветения, засыхают и опадают.

## Меры борьбы

Борьба направлена против взрослых жуков до того, как они отложили яйца – в конце сентября – начале октября. После 20 сентября лучше всего проводить обследования путем стряхивания деревьев, и когда устанавливается в среднем более 5–8 жуков на дерево, следует начать опрыскивание и завершить его в течение 5–6 дней.

В грушевых садах, где не проводилась регулярная борьба с вредителями, грушевый почковый долгоносик обычно размножается, и его плотность популяции часто превышает экономический порог вредоносности – 5–8 особей на дерево, что делает необходимым опрыскивание против взрослых особей до яйцекладки препаратами Дурсбан 4E – 0,15% или Вазтак Нью 100ЕС – 0,0125% и др. Борьба с этим вредителем эффективна только против взрослых форм в начале осени. Позже личинки грушевого почкового долгоносика развиваются внутри почек, и повреждения обнаруживаются весной, когда борьба с ними уже невозможна.