

# Фитосанитарное состояние сельскохозяйственных культур на 01.09 Картофель

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 17.10.2014 Брой: 10/2014



В первые дни августа агрометеорологические условия в Западной Болгарии оставались нестабильными. Это дополнительно затруднило уборку пшеницы и ухудшило качество зерна. К концу месяца уборка пшеницы все еще не была завершена в возвышенных районах областей Кюстендил, Перник и София. К середине августа атмосфера стабилизировалась, температуры повысились, и в разных частях страны максимумы достигали 33-38°C.

Во второй половине августа часть яровых культур завершила свое развитие. Началась уборка подсолнечника и посев рапса. В Южной Болгарии, в районах с меньшим

количеством осадков в течение сезона, также началась уборка ранних гибридов кукурузы.

## КАРТОФЕЛЬ

Фенофаза: среднеранние – "уборка"

поздние – "рост клубней" - "увядание ботвы" Обильные и продолжительные осадки в период вегетации картофеля увеличили процент гнилых клубней в результате чрезмерного увлажнения почвы.

Колорадский жук

В течение вегетационного периода было проведено от 1 до 4 обработок против вредителя на площади 120,2 тысяч декаров. В области Пловдив с 8 августа было отмечено отрождение личинок третьего поколения колорадского жука.

Картофельная моль

В областях Благоевград, Кюстендил и София сохраняется слабый лёт бабочек вредителя на феромонные ловушки. В районе Благоевград обработка была проведена на площади 1,0 тысяча декаров.

Подгрызающие совки

Начало отрождения гусениц второго поколения было установлено в области Благоевград, ИООР-Разлог. Повреждение стеблей растений было подтверждено в области София, ИООР-Самоков, где зарегистрированная плотность была очень высокой – 5 гусениц/кв.м. Обработка была проведена на площади 4,7 тысяч декаров в районах: Благоевград, Кюстендил и область София.

Фитофтороз картофеля

Осадки в начале месяца создали условия для дальнейших инкубационных периодов фитофтороза на поздних сортах картофеля и для увеличения степени поражения патогеном.

Зарегистрированная степень поражения в областях Благоевград, Враца и Плевен составляет 5-25% поражения листьев (балл 1-2). В районе Смолян поражение листьев достигает 30-40% (балл 3), а в отдельных районах в ИООР Разлог и Перник листья поражены от 30 до 75% (балл 3-4). Уже при уборке ранних сортов картофеля было подтверждено повреждение клубней фитофторозом в отдельных посевах в областях Габрово, Кюстендил, Пазарджик и других. При уборке картофеля в августе было зарегистрировано до 15-20% пораженных клубней в области София и до 30% в районе Благоевград. Было обработано 119,3 тысяч декаров от 1 до 8 раз.

В течение августа продолжалось распространение бурых пятнистостей листьев (альтернариоз). Зараженные участки были зарегистрированы со степенью поражения в

районе Благоевград от 3 до 10% и в районе Смолян от 10 до 15%. Было обработано 94,142 тысяч декаров от одного до шести раз.