

Фитосанитарное состояние сельскохозяйственных культур на 09.01 Подсолнечник

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



В первые дни августа агрометеорологические условия в Западной Болгарии оставались нестабильными. Это еще больше затруднило уборку пшеницы и ухудшило качество зерна. К концу месяца уборка пшеницы все еще не была завершена в возвышенных районах Кюстендилской, Перникской и Софийской областей. В середине августа атмосфера стабилизировалась, температуры повысились, и в разных частях страны максимумы достигали 33-38° С.

Во второй половине августа часть яровых культур завершила свое развитие. Началась уборка подсолнечника и посев рапса. В Южной Болгарии, в районах с меньшим

количеством осадков в течение сезона, также началась уборка раннего гибридного кукурузы.

ПОДСОЛНЕЧНИК

Фенофаза: "созревание" – "уборка"

Культура находится в очень хорошем фитосанитарном состоянии. В течение вегетации подсолнечника запасы почвенной влаги в большинстве областей страны были в пределах оптимальных значений. В августе была зарегистрирована повышенная распространенность **бурой пятнистости листьев (фомопсис)** в областях Видин, Велико-Тырново и Перник – от 7 до 15% растений были поражены. Проявления **альтернариоза** со слабой до умеренной распространенностью присутствовали в районах Видина, Перника, Тырговиште и Шумена. Влажная погода с умеренными температурами благоприятствовала развитию **серой гнили** на корзинках подсолнечника. Отдельные растения с пятнами на корзинках были обнаружены в Перникской области. Распространенность достигает до 5,8% растений в Силистренской области на площади 15 тысяч декаров. В Силистренской области, на площади 15 тысяч декаров, распространенность достигает до 5,8% растений. Уборка культуры началась.