

Агрометеоролошка прогноза за март 2019.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.03.2019 Брой: 3/2019



Početkom marta, agrometeorološke uslove će odrediti vreme toplo za ovu sezonu. Tokom prve dekade, u većini ratarskih regiona zemlje, prognozirane vrednosti prosečnih dnevnih temperatura će premašiti biološki minimum neophodan za nastavak vegetacionih procesa kod ozimih žitarica i uljane repice.

Početkom druge dekade, predviđa se pad temperatura, izraženiji u Severnoj Bugarskoj i na visokim poljima, što će ograničiti i odložiti razvoj poljoprivrednih useva. Tokom ove dekade, uslovi za sporu vegetaciju kod ozimih žitarica stvoriće se uglavnom u krajnjim jugoistočnim i južnim regionima zemlje.

Krajem druge i početkom treće dekade marta, očekuje se poboljšanje temperaturnih uslova i aktivacija vegetacionih procesa kod jesenje posejanih useva i višegodišnjih zasada. Do kraja marta, većina

kasnorazvijenih useva pšenice i ječma koji su prezimili u fazi 2–3 lista ući će u fazu busanja. Kod ozimih žitarica koje su se izbusile u jesen, primećen je porast koeficijenta busanja. Krajem marta, uljana repica koja je prezimila u fazi rozete formiraće izbojke.

U martu će se kod voćaka odvijati faze bubrenja i pucanja pupoljaka.

Krajem meseca, kod ranocvetajućih vrsta (badem, kajsija, breskva) primećuje se faza cvetnog pupoljka, a na pojedinim mestima, uglavnom u južnim regionima, i početak cvetanja. Tokom meseca, prognozirane minimalne temperature, do minus 8°C, predstavljaju rizik za najnaprednije voćke koje su ušle u faze formiranja pupoljaka i cvetanja. Očekivane padavine u martu, oko normale, povećaću rezerve vlage u zemljištu u sloju od jednog metra i dublje. Krajem februara, u većini ratarskih regiona, rezerve zemljišne vlage za ozime žitarice u sloju od jednog metra bile su iznad 90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Izuzetci su primećeni na pojedinim mestima u Podunavlju (agrometeorološka stanica Novachene), u krajnjim južnim (Haskovo) i istočnim regionima (D. Chiflik), gde je nivo rezervi vlage bio niži – 85–86% PVK. Tokom meseca, povoljniji uslovi za izvođenje predsetvene obrade površina namenjenih setvi ranih i srednje ranih jarih useva, i za izvođenje tretmana zaštite bilja u voćnjacima, javiće se početkom meseca, u drugoj polovini druge dekade, i sredinom treće dekade. Sredinom marta počinje agrotehnički prozor (15–20.03) za setvu suncokreta u Južnoj Bugarskoj, a sredinom treće dekade (25.03–5.04) – u Podunavlju.

Izvor: NIMH