

Погодни услови за извођење предсетвених обрада и сетве сунцокрета биће присутни крајем марта

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.03.2019 Брой: 3/2019



U narednom periodu, agrometeorološki uslovi će biti određeni temperaturama iznad klimatskih normi za treću dekadu marta.

Neobično za početak proleća, razvoj ozimih useva u delu ratarskih regiona zemlje odvijace se u uslovima nezadovoljavajućih rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm – posledica padavina ispod normale na kraju zime, temperatura iznad normale u martu i aktivne vegetacije useva. Krajem druge dekade marta, najniže rezerve vlage u sloju od 50 cm, izmerene kod pšenice, zabeležene su pojedinačno u južnim i jugoistočnim regionima

zemlje, ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta. Najbolje rezerve vlage, iznad 85–90% poljskog vodnog kapaciteta, zabeležene su kod ozimih useva u severozapadnim delovima Podunavske ravni.

Pred kraj perioda, očekuje se sniženje temperatura i promena agrometeoroloških uslova. Prognozirane vrednosti minimalnih temperatura, mestimično do minus 2°C, predstavljaju rizik po cvetanje i zmetanje plodova koštičavih vrsta koje su uznapredovale u razvoju, naročito ako se niske temperature oduže.

Očekuju se dalje padavine i uslovi za nicanje posejanih prolećnih useva će se poboljšati.

Kod pšenice, faza busanja će se masovno primećivati, a na pojedinim mestima u severoistočnim regionima (Carev Brod, Donji Čiflik) – početak izbijanja stabiljike. Kod uljane repice, u toku će biti formiranje grananja.

Tokom većine dana u periodu, uslovi će biti pogodni za izvođenje predsetvene obrade zemljišta i setvu suncokreta. Tokom perioda, ističe optimalni rok za setvu suncokreta u Južnoj Bugarskoj. Sredinom treće dekade marta, počinje agrotehnički prozor za setvu suncokreta u Podunavskoj ravni (25.03–05.04).

Izvor: NIMH