

Влажно време током прве половине маја је предуслов за развој гљивичних патогена.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



Vlažno vreme će stvoriti uslove za pojavu i razvoj gljivičnih patogena, čija prevencija zahteva primenu sistemskih fungicida.

U periodu od 3. do 9. maja prognoziraju se dinamični i promenljivi agrometeorološki uslovi. Vegetacioni procesi u ratarskim usevima će se odvijati uz prosečne temperature ispod klimatskih normi i uz česte padavine, prema sinoptičkoj prognozi.

U prvoj polovini perioda očekuju se padavine, na mnogim mestima u nizijskim predelima zemlje i intenzivne, koje će održati poboljšane rezerve vlage u zemljištu nakon prevaziđene ranoproljetne suše. Očekivano vetrovito

vreme dodatno će ograničiti mogućnosti za izvođenje zaštite bilja u usevima ozimih žitarica, uljane repice i u višegodišnjim voćnim nasadima.

U toku perioda, pšenica će se nalaziti u fazama izdizanja stabla, prelaza iz izdizanja stabla u vlatarenje i vlatarenja. Kod uljane repice primećivaće se cvetanje, formiranje i rast mahuna. Kod posejanih jarih useva odvijaćе se formiranje listova.

Vlažno vreme će stvoriti uslove za pojavu i razvoj gljivičnih patogena, čija prevencija zahteva primenu sistemskih fungicida.

Pred kraj perioda prognozira se poboljšanje agrometeoroloških uslova (početak porasta temperatura, slabljenje vetra, mala verovatnoća padavina) i stvaranje povoljnijih mogućnosti za izvođenje agrotehničkih radova.

Izvor: RHMZ