

Болести и штеточине јагоде и малине у мају

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 24.05.2019 Брой: 5/2019



Kod **maline** prskanja su usmerena protiv didimele, antraknoze, sušenja baza izdanaka/leptosferioze/, sive plesni, malinovog agrilusa, malinovog mušice, malinovog žučnjaka i malinovog buba. Protiv bolesti koristi se jedan od sledećih fungicida: Dithane M45 – 0,2%, Kocide 200 WG – 0,12%, Funguran OH 50 WP – 0,15% i Cuprozet Gold M – 0,15%. Za suzbijanje štetočina maline nema insekticida uključenog u listu odobrenih proizvoda za zaštitu bilja. Prema Colovoj, 2002, insekticidi Bi-58 – 0,1%, Karate Zeon – 0,02%, Vaztak New – 0,015% i Decis 2,5 EC – 0,04% su efikasni protiv navedenih štetočina. Autor preporučuje da se prva dva insekticida koriste pri prvom prskanju, a druga dva pri drugom prskanju. Po pojavi grinja, primenjuje se NeemAzal TS u koncentraciji od 0,3–0,5%. Ovaj biopreparat takođe deluje na lisne uši i zrikavce.

Zasadi jagode u maju se prskaju protiv sive plesni, pepelnice, jagodinog rilaša i jagodinog stabljikara. Protiv sive plesni koristi se jedan od sledećih fungicida: Switch 62,5 WG – 100 g/ju, Signum WG – 75 g/ju, Synpro SC – 150 ml/ju, Captan – 150 g/ju, Thiram 80 WG – 0,3%, Shavit F WDG – 0,2%, Prolectus 50 WG – 80–120 g/ju. Za zaštitu jagode od pepelnice, prskanje se vrši jednim od odobrenih fungicida: Systhane 20 EW – 30 ml/ju, Systhane Ecozon EW – 55–130 ml/ju, Cidely Top DC – 10 ml/ju, Ortiva Top SC – 100 ml/ju, Shavit F 72 WDG – 0,2%, Thiovit Jet 80 WG – 500 g/ju. Od navedenih fungicida, Cidely Top DC je takođe efikasan protiv bele pegavosti lista.

Protiv rilaša koristi se Avant 150 EC – 25 ml/ju ili Calypso 480 SC – 20 ml/ju.