

Агрометеоролошка прогноза за месец јун

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 05.06.2019 Брой: 6/2019



Većinu dana u junu, agrometeorološke uslove će određivati nestabilno vreme sa neravnomerno raspoređenim padavinama, što će takođe rezultirati značajnim razlikama u nivolma zaliha vlage u zemljištu. U zapadnoj Bugarskoj, gde se očekuje da će padavine u junu, slično kao u maju, dostići i premašiti mesečne norme, prognoziraju se veoma dobre zalihe vlage u zemljištu. Za prolećne useve, u sloju od 50 i 100 cm one će ostati iznad 80% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Niži nivoi zaliha vlage u zemljištu očekuju se u istočnim regionima, gde je takođe prognozirano manje padavina u junu.

Tokom prve i druge dekade, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati umerenom brzinom, pod temperaturama bliskim klimatskim normama. Početkom juna, na višim poljima, odviјаće se naliivanje zrna kod ozimih žitarica. Kod pšenice u nizijskim područjima, primećuje se faza mlečne zrelosti, dok kod ječma – mlečna zrelost i

prelazak u fazu voskaste zrelosti. Kod pšenice, tokom inter-faznog perioda nalivanje zrna – mlečna zrelost, larve štitastog smrdljivca (*Eurygaster integriceps*) nanose ozbiljnu štetu. Tokom ovog perioda, neophodno je pregledati useve pšenice na prisustvo štetočine i, pri gustini većoj od praga ekonomske štete (2 larve/m²), insekticidni tretman je imperativ.

Krajem prve i početkom druge dekade, ječam će pretežno biti u fazi voskaste zrelosti, a uljana repica u fazi sazrevanja.

Tokom treće dekade, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati ubrzanom brzinom, pod iznadprosečnim temperaturnim uslovima. U prvoj polovini ove dekade, pšenica u nizijskim područjima će dostići voskastu i punu zrelost. Do kraja juna, neki od prolećnih useva će ući u faze reproduktivnog razvoja – kod suncokreta, počće cvetanje, a kod ranih hibrida kukuruza – metličanje i cvetanje metlice.

Tokom meseca, prognozirane maksimalne temperature, mestimično do 35°C, imaće negativan uticaj na cvetanje i oplodnju kod povrtarskih useva. Meteorološki uslovi u junu će održavati povišeni infektivni potencijal gljivičnih patogena: kasna smeđa trulež kod kasnijih sorti trešanja, krastavost i pepelnica kod voćaka, plamenjače u vinogradima i kod povrtarskih useva. Kod vinove loze, inter-fazni period od cvetanja cvatova do formiranja bobica veličine graška je kritičan za infekciju plamenjačom. Tokom prve dekade juna, prognozira se povećana verovatnoća pojave grada, sa rizikom od poleganja useva i dodatne štete na poljoprivrednim usevima. Nakon oluje sa gradom, oštećene voćne i povrtarske useve neophodno je prilikom prve mogućnosti tretirati fungicidima na bazi bakra.

Tokom meseca, pogodniji uslovi za izvođenje vegetacionog obrade zemljišta za prolećne useve nastupiće u trećoj dekadi.

Izvor: NIMH