

Повећан инфективни фонд од гљивичних патогена код повртарских и воћарских култура

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.07.2019 Брой: 7/2019



Tokom sedmodnevnog perioda (19 – 25. jul) razvoj ratarskih useva će se odvijati ubrzanim tempom, pod iznadprosečnim temperaturama i, u delu južnih regiona, uz dobre rezerve vlage u slojevima zemljišta od 50 i 100 cm. Padavine tokom druge dekade jula premašile su na pojedinim mestima u južnoj Bugarskoj 30-40 l/m² (Blagoevgrad - 41 l/m², Plovdiv - 34 l/m², Sliven - 56 l/m², Burgas - 40 l/m², Kardžali - 41 l/m² i Čirpan - 33 l/m²). Ove padavine imale su povoljan uticaj na prolećne useve, koji se nalaze u reproduktivnim fazama rasta sa povećanim potrebama za vodom.

Tokom ovog perioda, suncokret će biti u fazi nalivanja zrna. Kod kukuruza će se moći uočiti različite faze – od cvetanja i metličanja kod kasnih hibrida do faze mlečne zrelosti kod ranih hibrida kukuruza na terenima širom zemlje. U trećoj dekadi jula, pasulj će biti u fazi zrenja, a pamuk će ući u početak cvetanja.

Tokom predstojećeg perioda, u većem delu zemlje, sa izuzetkom pojedinih mesta u istočnim regionima, predviđa se relativno sušno vreme, što obezbeđuje pogodne uslove za izvođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti, od kojih je najvažnije završetak žetve pšenice. Trenutno, prinosi pšenice dobijeni na agrometeorološkim stanicama NIMH-a kreću se između 420 kg/jutru na stanicama Dolni Čiflik i Karnobat i 650 kg/jutru na stanici Glavinica.

Tokom ovog perioda, tretmane za zaštitu bilja treba sprovoditi u hladnijim satima dana, sredstvima za zaštitu bilja sa odgovarajućim prethodnim rokom od korišćenja do žetve, u skladu sa periodom zrenja useva. Česte padavine tokom prve polovine jula povećale su infektivni potencijal određenih gljivičnih patogena: peronospori na povrtarskim kulturama, kasne smeđe truleži na ranim sortima voća (breskve, nektarine, šljive i kruške). U trećoj dekadi jula, u voćarskim kulturama, ne treba potcenjivati suzbijanje druge generacije voćnih moljaca. U vinogradima, tretmani protiv pepelnice (oidijuma) mogu se kombinovati sa onima protiv grinja i larvi druge generacije grozdane savijače.

Izvor: NIMH