

Агрометеоролошка прогноза за август

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2019 Брой: 8/2019



U većini dana prve dekade avgusta, agrometeorološki uslovi će biti određeni nestabilnim vremenom i temperaturama oko i nešto ispod normale za taj period. Prognozirani meteorološki uslovi na početku meseca povećaće nivo infekcija od određenih gljivičnih patogena: plamenjače na povrtarskim usevima iz kasne poljske proizvodnje, kasne smeđe truleži u voćnjacima i sive truleži na ranim sortama grožđa koje sazrevaju.

Padavine sa kraja jula, koje su na pojedinim mestima u severozapadnim i centralnim regionima premašile 30-40 l/m² (N. Selo, Vidin, Vraca, Montana, Loveč, V. Tarnovo), i padavine koje se očekuju tokom prve dekade avgusta, imaće povoljan uticaj na druge useve i na kasnije hibride kukuruza, kod kojih će se odvijati formiranje i naliwanje zrna. Tokom dekade, srednje rani hibridi kukuruza biće u fazi mlečne zrelosti, dok će rani hibridi dostići

voštanu i punu zrelost (agrometeorološke stanice Bazovec, Kneža, Glavinica, Pazardžik, Plovdiv). Kod suncokreta, u Podunavskoj ravni i u južnim regionima, nastupiće faza sazrevanja.

Krajem prve dekade, prognozira se značajan porast temperatura i ubrzano odvijanje završnih faza razvoja kasnih poljskih useva. Tokom druge i treće dekade, agrometeorološki uslovi će biti određeni relativno suvim vremenom i temperaturama oko i iznad klimatskih normi.

Tokom druge polovine avgusta, veliki deo kasnih poljskih useva završiće svoj razvoj. Kod suncokreta, primećena će biti masovna tehnička zrelost, a kod soje – faza sazrevanja. Krajem meseca, kod srednje kasnih hibrida kukuruza prevladavaće voštana zrelost. Kod pirinča nastupiće faza mlečne zrelosti, a kod pamuka – otvaranje mahuna.

Tokom druge polovine meseca, deficit zemljišne vlage kod drugih useva će se produbiti i zahtevaće povećane norme navodnjavanja. Na mnogim mestima u ratarskim regionima, nedostatak vlage u gornjim slojevima zemljišta otežaće kvalitetno izvođenje duboke oranja i predsetvene obrade površina predviđenih za setvu ozime uljane repice. Agrotehnički rokovi setve uljane repice počinju u trećoj dekadi avgusta.

U avgustu, kod kasnih sorti voćaka, ne treba potcenjivati štetnu aktivnost poslednje generacije voćnih moljaca. Relativno suvo vreme tokom većine dana u mesecu biće preduslov za povećanje populacija grinja. U vinogradima je neophodno pratiti pojavu i gustinu larvi treće generacije evropskog grozdanog moljca. Zaštitna tretmana biljaka treba sprovoditi tokom hladnijih sati u danu proizvodima sa odgovarajućim prethodnim periodom do žetve, u skladu sa periodom sazrevanja useva.

Izvor: RHMZ