

Агрометеоролошка прогноза за септембар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.09.2019 *Брой:* 9/2019



Početak septembra, agrometeorološki uslovi će biti određeni suvim, toplim i, na mnogim mestima u nizijskim predelima, vrućim vremenom, što će ubrzati napredovanje završnih faza razvoja kasnih ratarskih useva. Tokom prve nedelje meseca, srednje kasni hibridi kukuruza će dostići voštanu i punu zrelost, dok će kasni hibridi biti u mlečnoj fazi i prelazu u voštanu zrelost.

Većinu dana prve dekade, uslovi će ostati pogodni za obavljanje žetve suncokreta i za oslobađanje površina zasejanih ranijim hibridima kukuruza. Krajem dekade, predviđa se pad temperatura i promena agrometeoroloških uslova. Očekivane padavine, nakon pojačane suše krajem leta, poboljšaće stanje gornjih slojeva zemljišta, što je preduslov za kvalitetniju predsetvenu obradu i setvu ozimog uljane repice. Optimalni agrotehnički rokovi za setvu uljane repice su do kraja druge dekade septembra.

Tokom druge i treće dekade, agrometeorološki uslovi će biti određeni temperaturama bliskim klimatskim normama. Do sredine septembra, kasni hibridi kukuruza će završiti svoj razvoj; pirinač će biti u voštanoj i punoj zrelosti, a šećerna repa će dostići tehničku zrelost. U trećoj dekadi, ranije od uobičajenih rokova, kasne sorte vinskog grožđa će dostići tehnološku zrelost. Pamuk će biti u fazi zrenja.

Predviđene padavine tokom druge polovine druge i početka treće dekade biće od velikog značaja za normalno nicanje uljane repice. U regionima gde vlaga nije ograničavajući faktor, u usevima posejanim u agrotehničkom roku, faza nicanja će se uočiti krajem septembra. U fazi nicanja, ozbiljne štete na uljanoj repici nanose lisna buva repice (odrasli jedinci) i repičina pilica (lažne gusenice), što zahteva monitoring tokom ove faze radi utvrđivanja pojave i gustine populacije štetočina. Kada gustina pređe prag ekonomske štetočnosti (PES za lisnu buvu repice - 2 jedinke po m²; PES za repičinu pilicu 2-3 lažne gusenice po m²), tretman je obavezan.

U septembru, za povrtarske kulture iz kasne ratarske proizvodnje, ne treba potcenjivati mere zaštite bilja od gusenica treće generacije pamučnog sovića, jer one uzrokuju štetu i pogoršavaju kvalitet povrtarskog prinosa.

Tokom treće dekade meseca, na višim poljima ne može se isključiti mogućnost formiranja mraza, što treba uzeti u obzir prilikom berbe povrtarskih kultura osetljivih na mraz (paradajz, paprika).

Izvor: RHMZ