

Jesenje aktivnosti zaštite bilja u voćnjaku

Автор(и): д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен

Дата: 26.09.2019 Брой: 9/2019



У септембру се наставља летње-јесења суша. Израженија је у источним регионима, где је просечна месечна количина падавина 25-30 l/m². У западном делу земље не прелази 40-50 l/m².

У неким годинама, просечна месечна количина падавина износи између 5 и 10 l/m². Просечна дневна температура је од 15 до 20 °C, а после 20. септембра опада за скоро 2-3 °C. Највиша дневна температура достиже 28-32 °C, а најнижа просечна температура је између 3 и 8 °C.

Под овим климатским условима, окружење је повољно за појаву и размножавање поливолтинских инсеката и акари. Развијају своје последње генерације, а густина ових популација ће у великој мери

одредити ниво штете наредне године. Током месеца стварају се услови за стварање обиље росе, што је узрок инфекција парше јабуке и крушке, фитофторе на касним парадајзима и других.

Јабуке и крушке

На почетку месеца треба пратити лет јабучине вољке (крај друге и делимично треће генерације) и извршити третмане где је то потребно.

Након темељне провере и откривања касних инфекција парше, као и за сузбијање болести које се развијају током складиштења производње, изводе се третмани са Topsin M 70 WG - 0,1% или Top plus 70 WP - 0,1%. За добро складиштење јабука и крушака и за смањење трулежи и пропадања током складиштења, такође је препоручљиво извршити један пост-бербени третман са Topsin M 70 WG - 0,120%. Након прскања, плодови се оставе да се осуше, а затим се слажу у хладњаче или дубоке, хладне подруме.

Виногради

У овом периоду, сива трулеж наноси значајну штету виновој лози од почетка бојења бобица до бербе. Стога, у влажном и хладном времену у септембру, изводе се третмани са Topsin M 70 WG - 0,2%. У овом тренутку, одрасли примерци треће генерације виноградарске савијачице су такође у лету. Гусенице оштећују бобице грожђа које сазревају или су већ сазреле. За сузбијање штеточина, у фунгицидни раствор за прскање додаје се регистровани пиретроид.

Једногодишње саднице винове лозе се прекривају земљом 3-5 cm изнад места калемљења. Ова операција се изводи крајем септембра.

У складу са Законом о заштити биља, пољопривредници су дужни да користе само производе за заштиту биља који су одобрени за употребу за одређену усеv и штеточину, и у одговарајућој дози.

Производи за заштиту биља одобрени за промет објављују се на веб сајту Бугарске агенције за безбедност хране на електронској адреси: <http://www.babh.government.bg/> или у „Листи производа за заштиту биља одобрених за стављање на тржиште и употребу“ 2019.

Производи за заштиту биља се купују само од комерцијалних компанија које имају одобрење!

Пажња! При раду са производима за заштиту биља, морају се поштовати сви захтеви за безбедност на раду, заштиту пчелињих заједница од тровања и заштиту животне средине од загађења!