

Агрометеоролошка прогноза за октобар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.10.2019 Брой: 10/2019



U oktobru će agrometeorološke uslove određivati temperature oko i iznad klimatskih normi, kao i padavine bliske mesečnim prosečnim vrednostima.

Početak oktobra, prognozirane temperature iznad normale, sa maksimalnim vrednostima do 29-30°C, ubrzaće zrenje kasnih sorti voćaka i grožđa i biće preduslov za formiranje dodatnog prinosa od kasnih povrtarskih kultura.

Nakon neuobičajeno toplog vremena tokom druge polovine prve dekade, očekuje se normalizacija termalnih uslova. Padavine krajem septembra i očekivane kiše tokom prve dekade oktobra obezbediće vlagu za nicanje useva posejanih početkom jeseni. Suša krajem leta u mnogim delovima zemlje odložila je predsetvenu obradu

površina predviđenih za setvu jesenjih useva. Iz tog razloga, u velikom delu ratarskih regiona propušteni su agrotehnički rokovi setve ozimog uljane repice. Oktobar je optimalan period za setvu ozimih žitnih kultura. Tokom prve dekade je agrotehnički rok za setvu pšenice u Severnoj Bugarskoj, od 15. do 25. oktobra u Južnoj Bugarskoj, a krajem meseca – duž crnomorske obale.

Tokom većine dana druge i treće dekade, razvoj zasejanih useva uljane repice i ozimih žita će se odvijati umerenom brzinom, pod temperaturnim uslovima bliskim normi. Prognozirane padavine u drugoj polovini oktobra očekuje se da će poboljšati nivo rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm i uslove za tok početnih faza vegetacije jesenjih useva. Krajem meseca, kod pšenice, u zavisnosti od rokova setve, primećivaće se sledeći stadijumi: nicanje, treći list i početak klasanja, uglavnom u usevima posejanim početkom oktobra. Kod uljane repice, odvijaće se formiranje listova. Krajem oktobra, u najranije posejanim usevima uljane repice, posejanim u septembru, primećivaće se početak faze formiranja rozete.

U oktobru, jesenje useve napada niz štetočina. Kod ozimih žita, mora se pratiti štetno delovanje obične voluharice, pšenične zlatarice i žitnih muva, a kada gustina štetočina pređe prag ekonomske štete (PES), treba izvršiti pravovremenu zaštitu. Za običnu voluharicu, PES je 2 aktivne kolonije po dekaru; za pšeničnu zlataricu – 3 larve/m².

Kod uljane repice, tokom meseca moraju se vršiti pregledi za pojavu repine buve (odrasli primerci) i repine piljevine (lažne gusenice), a kada njihov broj pređe PES, treba izvršiti insekticidno prskanje.

Izvor: NIMH