

Агрометеоролошка прогноза за почетак новембра

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2019 Брой: 11/2019



Kraj proteklog perioda, u severoistočnoj i severozapadnoj Bugarskoj palo je od 10 do 20 l/m² padavina: u Novom Selu – 10 l/m², Vidin – 16 l/m², Ruse – 11 l/m², Razgrad – 10 l/m² i Silistra – 20 l/m², što je privremeno poboljšalo uslove za početne faze razvoja ozimih žitavnica. U ostalim regionima zemlje, padavine su bile beznačajne i tamo se razvoj poljoprivrednih useva odvija otežano usled deficita vlage u zemljištu.

Tokom naredne sedmodnevne periode, agrometeorološki uslovi će biti određeni toplim i pretežno suvim vremenom. Razvoj poljoprivrednih useva, gde vlažnost zemljišta nije ograničavajući faktor, odviјаće se normalnim tempom na temperaturama oko i iznad klimatske norme. Za pšenicu, na agrometeorološkim

stanicama Pavlikeni i Haskovo primećuje se faza nicanja, na agrometeorološkim stanicama Novachene i Silistra – početak formiranja listova, a na agrometeorološkim stanicama Karnobat, Glavinitsa i Yambol – treći list.

Početak novembra, uslovi će biti pogodni za obradu zemljišta na parcelama predviđenim za prolećne useve, za sadnju mladih voćaka, i za prskanje voćaka 5% rastvorom uree nakon masovnog opadanja listova. Tretmane treba sprovoditi pri mirnom vremenu, pri brzini vetra do 2–3 m/s.

Izvor: NIMH