

Агрометеоролошка прогноза за новембар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.11.2019 Брой: 11/2019



Produžena jesenja suša odložila je razvoj ozimih žitarica i uljane repice i dovela u pitanje opstanak dela nicalih useva. Vlažnost zemljišta u slojevima od 50 cm i 100 cm je neuobičajeno niska za sredinu jeseni u većem delu zemlje. U nekim oblastima severozapadne Bugarske, Sofijskog polja i Gornjotračke nizije (agrometeorološke stanice: Knezha, Băzovec, Lozen, Plovdiv, Pazardzhik, Sliven) nivo rezervi vlage u zemljištu u jednometarskom sloju je ispod 50% poljskog vodnog kapaciteta.

Tokom prve polovine novembra, agrometeorološki uslovi će biti određeni temperaturama iznad normale. Predviđene padavine na početku i na kraju prve dekade, u većini obradivih područja, neće biti dovoljne da prevaziđu deficit vlage u gornjim slojevima zemljišta za ozime žitarice i uljanu repicu.

Padavine od agronomskog značaja i značajno povećanje rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm predviđaju se za drugu polovinu novembra. U većini dana ovog perioda, razvoj ozimih žitarica i uljane repice u obradivim područjima će se odvijati pri prosečnim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama.

Krajem druge dekade, očekuje se značajan pad temperatura i, na višim poljima, gde nije isključen sneg, vegetativni procesi kod jesenjih useva će jenjavati.

Tokom treće dekade novembra, razvoj jesenjih useva u većini obradivih područja će se odvijati sporim tempom pri temperaturama koje se približavaju biološkom minimumu neophodnom za vegetaciju pšenice, ječma i ozime uljane repice. Uslovi za aktivnije vegetativne procese kod jesenjih useva stvoriće se uglavnom u južnim i jugoistočnim regionima zemlje. Krajem novembra, dominantna faza kod pšenice i ječma će biti treći list. Kod kasnije posejanih novembarskih useva primećivaće se faza nicanja. U delu ozimih žitarica na krajnjem jugu i istoku zemlje, koje su formirale 2–3 lista u oktobru, primećivaće se faza busanja. Kod uljane repice, kao rezultat jesenje suše, samo mali deo useva će uspeti da do kraja novembra uđe u početak faze formiranja rozete (5–6 listova).

Predviđene minimalne temperature tokom meseca, u opsegu od minus 5–8°C, su iznad kritičnih nivoa za zakasnele ozime žitarice u fazi nicanja.

Pogodniji uslovi za sadnju voćaka i za izvođenje jesenjeg prskanja u svrhu zaštite bilja u novembru javiće se tokom prve polovine meseca.

Tokom prve dve nedelje novembra, treba nastaviti sa praćenjem jesenjih useva, posebno onih gajenih u monokulturi, kako bi se utvrdila gustina populacije određenih štetočina: žitne muve, obične voluharice, repičine pilice (lažne gusenice), i, tamo gde njihov broj premašuje ekonomski prag štete (EPS), treba izvršiti pravovremenu zaštitu. EPS za običnu voluharicu je 2 aktivne kolonije po dekaru, a za larve (lažne gusenice) repičine pilice – 2–3 po m².

Izvor: NIMH