

Агрометеоролошка прогноза за децембар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2019 Брой: 12/2019



Iznadnormalne temperature i poboljšane rezerve vlage u zemljištu tokom druge polovine novembra produžile su jesenju vegetaciju pšenice, ječma i uljane repice. Tokom prve dekade decembra agrometeorološki uslovi biće veoma dinamični. Predviđeno zahlađenje oko sredine perioda dovest će do usporavanja, a u delovima Severne Bugarske i zapadnim regionima, gde se očekuju padavine uključujući i sneg – do prestanka vegetacionih procesa kod ozimih žitarica i uljane repice. Krajem prve dekade očekuje se porast temperatura, ali će njihove prosečne dnevne vrednosti ostati ispod biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju usejeva setih u jesen.

Tokom većine dana druge i treće dekade, predviđene temperature, oko i iznad klimatskih normi, održavaće ozime žitarice u relativnom mirovanju u većem delu zemlje. Izuzetci su mogući za pšenicu i ječam u krajnje južnim regionima i duž crnomorske obale. Tokom relativno toplijih perioda u drugoj polovini meseca u ovim

područjima postoji verovatnoća da će se stvoriti uslovi za kratkotrajno obnavljanje vegetacionih procesa kod usejeva setih u jesen, ali se ne očekuje promena u fenološkim fazama useva.

Kao rezultat produžene jesenje suše, usevi će ući u zimu u različitim fazama. U većem delu zemlje, sa izuzetkom pojedinih lokaliteta u jugoistočnoj Bugarskoj, deficit vlage u zemljištu je usporio vegetaciju pšenice, ječma i ozime uljane repice. Na kraju jeseni, dominantna faza razvoja ozimih žitarica je treći list. Deo useva pšenice, uglavnom u severozapadnim regionima (agrometeorološke stanice Băzovec, Pavlikeni), nalazi se u fazi nicanja i ranog razvoja listova (1–2 lista). Pšenica u istočnim regionima zemlje je u fazi busanja, u kojoj ozime žitarice uspešno prezimljuju. Kod uljane repice, kao posledica deficita vlage tokom jesenje vegetacije, samo deo useva je u fazi rozete – odgovarajućoj fazi za prezimljavanje.

U decembru, predviđene minimalne temperature do minus 11°C, u uslovima bez snežnog pokrivača i sa dužim trajanjem, biće kritične za ozime žitarice u fazi nicanja i ranog razvoja listova, i za useve uljane repice koji nisu uspeli da formiraju rozetu.

Nakon značajnih padavina tokom treće dekade novembra, koje su na mnogim mestima u Južnoj Bugarskoj (Sandanski, Pazardzhik, Plovdiv, Haskovo, Kardzhali, Chirpan) premašile 50–60 mm, došlo je do značajnog povećanja rezervi vlage u gornjim slojevima zemljišta i, u većini ratarskih regiona zemlje, deficit vlage kod usejeva setih u jesen je prevaziđen. Očekivane padavine u decembru, oko mesečne norme, dodatno će povećati rezerve vlage u zemljištu u sloju od 100 cm.

Izvor: NIMH