

Агрометеоролошка прогноза за крај године

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.12.2019 Брой: 12/2019



Nesezonski toplo vreme u drugom dekadu decembra, sa maksimalnim temperaturama preko 16-17°C na mnogim mestima u nizijskim predelima, dovelo je do ponovnog pokretanja vegetativnih procesa kod ozimih žitarica. Iznadprosečne decembarske temperature povoljno su uticale na kasno posejane useve pšenice, te su neki od njih dostigli potrebnu sumu temperatura za ulazak u fazu trećeg lista. Na nekim lokalitetima u severoistočnoj Bugarskoj, gde su zabeležene temperature od oko 19-20°C (Razgrad, Dobrič, Varna), povećao se i udeo useva pšenice u fazi busanja. Kao rezultat visokih temperatura u južnim regionima, kod nekih ranocvetajućih žbunastih i drvenastih vrsta (dren, trešnja) izazvano je neželjeno bubrenje pupoljaka.

Na početku trećeg dekada decembra, temperature su ponovo bile iznad normale, a prosečne dnevne vrednosti u većini nizijskih predela bile su iznad biološkog minimuma potrebnog za nastanak odložene vegetacije kod

ozimih žitarica.

Nakon neuobičajeno toplog vremena sredinom trećeg dekada decembra, agrometeorološki uslovi će se bitno promeniti. Očekivano hlađenje krajem perioda dovesti će do slabljenja i prestanka vegetativnih procesa kod jesenje posejanih useva, i sprečiće preuranjeni, neželjeni razvoj kod nekih višegodišnjih zasada, što bi rezultiralo smanjenjem njihove otpornosti na zimu.

U nizijskim predelima, uslovi će omogućiti izvođenje operacija obrade zemljišta. Predviđene padavine tokom trećeg dekada decembra povećaće nivo zaliha vlage u zemljištu u sloju od 50 cm. Krajem jeseni, na nekim lokalitetima u južnim regionima – agrometeorološke stanice Kjustendil, Čirpan i Sliven – zalihe vlage u zemljištu za pšenicu u sloju od 100 cm su nezadovoljavajuće, ispod 60% poljskog vodnog kapaciteta.

Izvor: NIMH