

Поздрављамо јануар са веома ниским минималним температурама

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 01.01.2020 Брой: 1/2020



Prognozirane minimalne temperature tokom meseca, do minus 15°C, u uslovima bez snežnog pokrivača i uz duže zadržavanje, biće kritične za ozime žitarice koje tokom jesenje vegetacije nisu uspele da uđu u fazu busanja. Ove vrednosti će takođe biti kritične za nerazvijene useje ozime uljane repice koji, kao posledica jesenje suše, nisu formirali rozetu (od 7–8 listova) – fazu u kojoj biljke uspešno prezimljavaju.

Visoke temperature u decembru produžile su vegetaciju jesenje posejanih useva. Kao rezultat temperatura iznad normale, neke od kasno nicalih ozimih žitarica u zapadnoj Bugarskoj, na agrometeorološkim stanicama Kneža, Sofija, Kjustendil, formirale su 2–3 lista.

U januaru će agrometeorološke uslove određivati temperature oko i iznad klimatskih normi, što će održavati jesenje posejane useve i višegodišnje zasade u stanju mirovanja. Ozime žitarice će ući u najhladniji mesec u godini u različitim fenološkim fazama – posledica produžene jesenje suše i odložene setve. Značajan deo useva će prezimiti u fazi tri lista. U fazi busanja, odgovarajućoj fazi za prezimljavanje, nalazi se veliki deo useva pšenice u istočnoj Bugarskoj, Silistri, Glavinici, Carevom Brodu, Donjem Čifliku, Jambolu, Karnobatu. Osnaženi, u fazi nicanja i početnog formiranja listova, su neki od kasno posejanih ozimih žitarica (posejanih u novembru) na pojedinim mestima u Podunavskoj ravnici, na agrometeorološkim stanicama Nikolaevo, Pavlikeni.

Prognozirane minimalne temperature tokom meseca, do minus 15°C, u uslovima bez snežnog pokrivača i uz duže zadržavanje, biće kritične za ozime žitarice koje tokom jesenje vegetacije nisu uspele da uđu u fazu busanja. Ove vrednosti će takođe biti kritične za nerazvijene useje ozime uljane repice koji, kao posledica jesenje suše, nisu formirali rozetu (od 7–8 listova) – fazu u kojoj biljke uspešno prezimljavaju.

Očekivane padavine u januaru, oko i ispod normale, povećaće rezerve vlage u zemljištu u slojevima od 50 cm i 100 cm. Na početku zime, u većem delu zemlje, nivo zaliha vlage u jednodmetarskom sloju zemljišta je neobično nizak za ovu godišnju dob. Na pojedinim mestima u zapadnoj Bugarskoj, na agrometeorološkim stanicama Kneža, Kjustendil, i u nekim od istočnih regiona, na agrometeorološkim stanicama Razgrad, Sliven, on je ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

U januaru će se pogodniji uslovi za izvođenje zimskog rezidbe u vinogradima i voćnjacima javiti tokom druge polovine meseca.

Izvor: NIMH