

# Динамично време са честим падавинама у марту

Автор(и): Растителна заштита  
Дата: 02.03.2020 Брой: 3/2020



Iznadnormalne sezonske temperature tokom druge polovine februara nastavile su vegetaciju velikog dela prezimljenih poljoprivrednih useva.

Tokom prvog dekada marta, agrometeorološki uslovi ponovo će biti određeni iznadnormalnim temperaturama. Predviđeno toplo vreme na početku meseca, sa maksimalnim temperaturama do 18-19°C, aktiviraće vegetativne procese u jesen zasejanim usevima i voćnim drveću u nizijskim regionima zemlje. Očekivane padavine tokom dekade poboljšaće rezerve vlage u zemljištu u pedesetocentimetarskom sloju zemljišta i uslove za razvoj ozimih žitarica i ozimog uljane repice. Tokom ovog perioda, značajan deo useva pšenice, koji su prezimili u fazi trećeg lista, ući će u fazu busanja. Kod uljane repice, dominantna će biti faza rozete.

Tokom drugog dekada, predviđene temperature, oko i nešto ispod klimatskih normi, ograničiće razvoj poljoprivrednih useva. Na pojedinim mestima u Severnoj Bugarskoj i u zapadnim regionima, gde padavine u obliku snega nisu isključene, primećujeće se slabljenje i kratkotrajni prekid vegetacije u jesen zasejanim usevima. U preostalim regionima zemlje, vrednosti prosečnih dnevnih temperatura biće bliske biološkom minimumu potrebnom za razvoj ozimih žitarica i ozimog uljane repice.

Tokom trećeg dekada marta, očekuje se poboljšanje termičkih uslova i aktivacija vegetativnih procesa u jesen zasejanim usevima. Krajem meseca, kod pšenice će biti dominantna faza busanja. Kod ozimih žitarica zasejanih u okviru optimalnog agrotehničkog perioda, primećujeće se povećanje koeficijenta busanja.

U martu, kod voćnih kultura odvijaće se sledeće fenološke faze: bubrenje i pucanje pupoljaka, a krajem trećeg dekada, kod koštičavih vrsta (badem, kajsija, breskva) u nizijskim regionima, primećujeće se formiranje cvetnih pupoljaka i cvetanje. Predviđene minimalne temperature tokom meseca, do minus 8°C, predstavljaće rizik za voćne kulture koje su uznapredovale u svom razvoju i ušle u faze formiranja cvetnih pupoljaka i cvetanja.

Padavine u februaru, nakon duge zimske suše, doprinele su prevazilaženju deficita vlage kod ozimih žitarica u gornjim slojevima zemljišta. Očekivane padavine u martu, oko i iznad norme, povećaće rezerve vlage u zemljištu u jednometarskom sloju zemljišta.

Većinu dana u martu, predviđeno dinamično vreme, sa čestim padavinama, otežavaće sprovođenje nekih sezonskih agrotehničkih aktivnosti. Povoljniji uslovi za izvođenje prskanja zaštite bilja u voćnjacima pre cvetanja, i za predsetvenu obradu površina predviđenih za rane i srednje rane prolećne useve, javiće se na početku meseca i tokom većine dana trećeg dekada. Sredinom marta, počinje agrotehnički prozor (15-20.03) za setvu suncokreta u Južnoj Bugarskoj, a sredinom trećeg dekada (25.03–5.04) – u Podunavskoj ravni.

*Izvor: NIMH*