

Teške aktivnosti zaštite bilja sredinom marta

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



Početkom marta, u zapadnoj i centralnoj Bugarskoj palo je 20 – 40 l/m² padavina, što je dovelo do povećanja rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm i 100 cm kod poljoprivrednih useva.

Sredinom marta, agrometeorološke uslove će odrediti prosečne dnevne temperature oko i iznad biološkog minimuma prezimljavajućih poljoprivrednih useva. Njihovi vegetacioni procesi će se odvijati uobičajenom brzinom. Predviđene padavine tokom prve polovine perioda, ponovo značajnije po količini u jugozapadnoj i centralnoj Bugarskoj, pogodovaće povećanju rezervi vlage u jednometarskom sloju zemljišta.

Tokom perioda, pšenica će biti u fazi masovnog klasanja i primećen je porast koeficijenta klasanja. Kod uljane repice će se javiti grananje. Kod voćnih vrsta, doći će do bubrenja i pucanja pupoljaka, a kod nekih koštičavih

vrsta (breskva, kajsija) u centralnoj i istočnoj Bugarskoj, javiće se i faza cvetanja. Tokom perioda, počinje agrotehnički rok za setvu suncokreta u južnoj Bugarskoj.

Predviđene padavine na mnogim mestima u ratarskim područjima otežaće izvođenje kvalitetne obrade zemljišta i sprovođenje mera zaštite bilja.

Izvor NIMH