

Значајан пораст температура на почетку априла

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 07.04.2020 Брой: 4/2020



Nakon neobičnih zimskih vremenskih pojava krajem marta i početkom aprila, koje su prouzrokovale dodatnu štetu na voćnim kulturama uznapredovalim u svom razvoju, tokom naredne sedmodnevne periode agrometeorološki uslovi će doživeti značajnu promenu.

Za prve dane perioda predviđen je porast temperatura. U ratarskim oblastima njihove prosečne dnevne vrednosti će dostići i premašiti biološki minimum neophodan za vegetaciju ozimih žitarica i uljane repice.

Predviđa se normalizacija temperaturnih uslova i aktiviranje vegetativnih procesa u jesenjim usevima i posejanim prolećnim kulturama do kraja perioda. Krajem prve deкаде aprila, kod pšenice i ječma će se uočiti

sledeće faze: busanje, prelazak u fazu izduživanja stabilike i faza izduživanja stabilike, uglavnom u usevima u delovima Podunavske nizije i u istočnim regionima zemlje (agrometeorološke stanice: Novachene, Silistra, Tsarev Brod, Razgrad, D. Chiflik, Karnobat). Kod ozime uljane repice uočiće se početak faze formiranja pupoljaka.

Do kraja prve dekade aprila, na mnogim mestima u ratarskim regionima, visok sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta, kao posledica obilnih padavina početkom proleća, otežavaće izvođenje predsetvene obrade i setvu srednje ranih prolećnih useva. Iz tog razloga očekuju se zakašnjenja u setvi suncokreta. Agrotehnički rok za setvu suncokreta u Podunavskoj niziji je do sredine prve dekade aprila, a do kraja dekade – u Severoistočnoj Bugarskoj, u primorskim područjima i na visokim poljima Jugozapadne Bugarske.

Povoljni uslovi za izvođenje zaštitnih tretmana prskanjem u voćnim kulturama koje nisu pogođene prolećnim mrazovima nastupiće tokom druge polovine perioda.

Izvor NIMH