

Куна може да нанесе озбиљну штету на плодове трешње

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 04.05.2020 Брой: 5/2020



Zlatna zlatarica – *Cetonia aurata* L. je rasprostranjena širom zemlje. Oštećuje voćke, sa preferencijom prema trešnji i kruški. Takođe se sreće na vinovoj lozi, ruži i šipak-u. Dodatno je utvrđeno da nanosi štetu kukuruzu i kupusu. Najčešće se javlja na cvetovima šipka i ruže. Takođe se hrani cvetnim delovima kamilice, korijandera i hajdučke trave.

Poslednjih godina zlatna zlatarica je primećena u nekim zasadima trešanja i kućnim baštama u regionu Kjustendila. Njena gustina populacije je veća u zakorovljenim područjima i u zaraslim žbunovima šipka i voćnjacima trešanja. Na pojedinačnim stablima zabeleženo je do 80 – 100 jedinki.

Odrasli insekt je relativno velika buba. Dužina tela je do 2 cm. Pronotum i elitre su intenzivno zelene sa zlatnim metalnim sjajem. Trbušna strana je bakarno-crvene boje. Na elitrama se nalaze bele poprečne pruge.

Zlatna zlatarica ima jednu generaciju godišnje. Bube prezimljavaju u zemljištu. U proleće se pojavljuju tokom cvetanja voćaka. Bube su aktivne i lete oko podneva, kada je najtoplije. Glodaju prašnike i tučak cvetova i oštećuju lišće i plodove.

Na zaraženim plodovima trešanje glodaju duboke rane i u većini slučajeva ih potpuno uništavaju. Zabeležili smo 80% oštećenih plodova na jednom stablu.

Šteta

Oplođene ženke polažu jaja u trulo drvo i u zemljištu bogatom trulim drvetom. Larve se razvijaju u ovoj truloj sredini i pupiraju iste godine.

Hemijska borba protiv zlatne zlatarice treba da bude usmerena na odrasli stadijum, koji nanosi glavnu štetu. Insekticidi do sada nisu testirani protiv ovog štetočine jer se nije često javljala. Borba je takođe komplikovana činjenicom da se prskanje mora sprovesti u vreme zrenja plodova i moraju se poštovati karantinski periodi.

Mere suzbijanja

Zlatna zlatarica pripada familiji skarabeja, koja takođe uključuje i dlakavu bubu. Preporučuje se upotreba insekticida sa kratkim periodom čekanja do berbe, koji su odobreni protiv dlakave bube: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da. Takođe se mogu koristiti svetlo plave ili bele zamke sa atraktantom. Da bi se smanjila šteta koju nanosi zlatna zlatarica, neophodna je i dobra agronomska praksa – redovna obrada zemljišta, đubrenje, sakupljanje, uklanjanje i uništavanje korovske vegetacije, žbunova šipka i trulih biljnih ostataka, gde se razvijaju larve štetočine.