

'Količina padavina i povećan rizik od tuče početkom maja'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 Брой: 5/2020



Tokom naredne sedmodnevne periode, agrometeorološki uslovi će biti određeni nestabilnim vremenom i prosečnim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama za prvu dekadu maja. U toku perioda predviđeni su rasprostranjeni padavini, uz poboljšanje uslova za vegetaciju jesenje setih useva i posejanih prolećnih useva. Nakon pojačane prolećne suše u severoistočnim regionima, očekivane padavine će pružiti priliku za oporavak dela ozimih žitnih useva koji su u kritičnom stanju. Deficit vlage u zemljištu na mnogim mestima u Severoistočnoj Bugarskoj bio je ograničavajući faktor za razvoj pšenice i uzrok žutila u delu useva.

U jugozapadnim regionima i u većem delu Tračke nizije, gde su u aprilu pale padavine od ekonomskog značaja – na nekim mestima preko 50-60 l/m² (Kjustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardžik-83

l/m², Plovdiv-87 l/m², Haskovo-93 l/m², Stara Zagora-50 l/m², Čirpan-67 l/m²), stanje ozimih žitnih useva je dobro.

Tokom narednog perioda, na poljskim površinama pšenica i ječam će preći iz faze izdizanja stabila u fazu klasanja i metlicanja. Za kukuruz i suncokret, u zavisnosti od vremena setve, primećivaće se faze nicanja i formiranja listova.

Tokom prve nedelje maja, ne predviđaju se kritične minimalne temperature za poljoprivredne useve, ali verovatnoća za grad ostaje povećana. U slučaju oštećenja od grada, preporučuje se da se oštećeni usevi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima koji sadrže bakar kako bi se smanjio rizik od sekundarnih infekcija.

Izvor: NIMH