

Агрометеоролошка прогноза за месец мај

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.05.2020 Брой: 5/2020



Tokom prve dekade maja, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati umerenim tempom, uz prosečne dnevne temperature bliske klimatskim normama. Na početku maja, očekivane padavine će biti odlučujuće za opstanak dela useva ozimih žita u severoistočnoj Bugarskoj. Krajem aprila, na mnogim mestima u severoistočnim regionima, nivo zaliha vlage u zemljištu za pšenicu u slojevima od 50 cm i 100 cm bio je neuobičajeno nizak za ovu sezonu, ispod 55-60% poljskog vodnog kapaciteta, kao posledica padavina ispod normale tokom prve polovine proleća. Iz tog razloga, deo zasada pšenice je u kritičnom stanju. Oštećenja i žutilo lisne mase (do 50-60%), kao posledica deficita vlage u zemljištu, zabeleženi su kod pšenice na agrometeorološkim stanicama Silistra i Carev Brod.

Tokom prve dekade maja, u ravnim regionima će se kod pšenice i ječma zapažati faza klasanja.

Krajem prve i tokom druge dekade, predviđa se porast temperatura i ubrzanje vegetacije kod ozimih žita i posejanih jarih useva. U tom periodu će se kod pšenice odvijati cvetanje, oplodnja i formiranje zrna.

Tokom treće dekade, agrometeorološki uslovi će biti određeni nestabilnim i prohladnim vremenom za taj period. Očekivane obilne padavine će imati izuzetno veliki značaj za ozima žita, kod kojih će biti u toku nalivanje zrna. Krajem maja, deo zasada ječma i pšenice na pojedinim mestima u južnim regionima će ući u fazu mlečne zrelosti.

Tokom meseca, kod kukuruza i suncokreta će se odvijati formiranje listova. Krajem treće dekade, kod suncokreta posejanog u agrotehničkom roku, zapažaće se formiranje cvatnje.

Kod voćaka, doći će do formiranja i povećanja plodova. Kod vinove loze, zapažaće se razdvajanje cvetnih grozdova i, krajem meseca, faza cvetanja.

Česte padavine u maju stvoriće povoljne uslove za razvoj brojnih gljivičnih oboljenja: plamenjače na vinovoj lozi i povrtarskim kulturama; parš na jabučastim voćkama, rana smeđa trulež i rupičavost lišća na koštičavom voću; rđe (žuta, braon) i fuzarioz klasa kod ozimih žita.

Pogodniji uslovi za izvođenje tretmana zaštite biljaka javiće se tokom druge polovine prve i većinom dana druge dekade.

U maju se ne predviđaju kritične minimalne temperature za poljoprivredne useve, ali verovatnoća za grad ostaje povećana. U slučaju oštećenja od grada, preporučljivo je da se oštećeni usevi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima na bazi bakra radi bržeg zarastanja rana i smanjenja rizika od sekundarnih infekcija.

Izvor: NIMH