

Период са условима за повећање инфективног позадинског нивоа гљивичних обољења у пољопривредним усевима

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 01.07.2020 Брой: 7/2020



Krajem juna i početkom jula, agrometeorološki uslovi će doživeti značajnu promenu. Tokom poslednjih dana juna, u ratarskim područjima se ne predviđaju padavine, što će pružiti priliku za izvođenje hitnih tretmana zaštite biljaka. Nestalno vreme koje je vladalo u prethodnom periodu stvorilo je uslove za povećanje infektivnog potencijala brojnih gljivičnih oboljenja: parši, rupičavosti lišća i kasne smeđe truleži voćaka; plamenjače vinove loze i povrtarskih kultura, itd. U mnogim delovima zemlje, obilne padavine su ometale žetvu zrelog žita. U pojedinim preplavljenim usevima pšenice, počelo je crnjenje klasova, što nosi rizik od pogoršanja kvaliteta zrna.

Tokom narednog perioda, razvoj jarih useva će se odvijati ubrzanim tempom, uz temperature oko i iznad klimatskih norma za početak leta i uz dobre do vrlo dobre zalihe vlage u gornjim slojevima zemljišta. U većini delova zemlje, sa izuzetkom krajnjih severozapadnih (agrometeorološka stanica Buzovac) i jugozapadnih regiona (agrometeorološka stanica Sandanski), zalihe vlage u zemljištu u sloju od 50 cm su na nivou iznad 75–80% poljskog vodnog kapaciteta. U tom periodu, suncokret će se nalaziti u fazama formiranja cvatnje i cvetanja, uglavnom u usevima u južnim regionima. Kod ranih hibrida kukuruza, primećivaće se faza metličanja i cvetanja metlice, dok će kod kasnijih hibrida biti faza formiranja lišća. Krajem juna i početkom jula, useve kukuruza treba pregledati na prisustvo jedne od najvažnijih štetočina – kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*), i kada njegova gustina pređe ekonomski prag štete (10 legala jaja na 100 biljaka), neophodan je tretman (protiv mladih larvi pre nego što se uvuku u stabiljke).

Početkom jula, ponovo se predviđaju padavine i uslovi za izvođenje najvažnije aktivnosti – žetve pšenice – će se pogoršati.

Izvor: RHMZ