

Агрометеоролошка прогноза за јул

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 07.07.2020 Број: 7/2020



Tokom prve polovine prve dekade jula, razvoj ratarskih useva će se odvijati u uslovima iznadprosečnih termičkih uslova. Na početku meseca, u većem delu zemlje, sa izuzetkom krajnjih severozapadnih (agrometeorološka stanica Buzovac) i jugozapadnih oblasti (agrometeorološka stanica Sandanski), vegetacija jarih useva će se odvijati u uslovima dobrih rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm i 100 cm (preko 75-80% poljskog vodnog kapaciteta) – kao rezultat obilnih, iznadprosečnih padavina u junu, koje su na pojedinim mestima premašile 90-100 l/m² (Montana – 96 l/m², Veliko Trnovo – 133 l/m², Ruše – 90 l/m², Silistra – 136 l/m², Dobrič – 105 l/m², Varna – 103 l/m², Kazanlak – 104 l/m², Haskovo – 92 l/m², Kardžali – 173 l/m², Stara Zagora – 115 l/m²).

Tokom prve dekade, u zavisnosti od ranosti hibrida kukuruza, javljaće se različite faze: formiranje listova, metličanje, cvetanje metlice i svilanje. Kod suncokreta, na poljskim parcelama će dominirati faza cvetanja, dok

ће u usevima na višim poljima biti formiranje cvatnje. Kod zrnastih mahunarki (pasulj, soja), primećuje se formiranje mahuna.

Tokom druge i početkom treće dekade, razvoj ratarskih useva će se odvijati umerenim tempom, na temperaturama oko i nešto ispod normale za taj period. Predviđene česte padavine u ovom periodu će imati povoljan uticaj na jare useve koji su u reproduktivnoj fazi svog razvoja, kada potreba za vodom naglo raste (kod kukuruza, u periodu od metličanja do mlečne zrelosti, dnevna potrošnja vode dostiže 6-7 m³/dan). Početkom treće dekade jula, deo ranih hibrida kukuruza na poljskim parcelama će ući u fazu mlečne zrelosti. Kod suncokreta, odviјаće se formiranje i nalivanje semena. Krajem meseca, u usevima posejanim u agrotehničkom roku, na pojedinim mestima u Podunavlju i u južnim oblastima, primećuje se početak faze sazrevanja.

Tokom poslednje nedelje jula, agrometeorološki uslovi će biti određeni relativno suvim, toplim i vrućim vremenom, što će zahtevati primenu odgovarajućeg režima navodnjavanja za kasne hibride kukuruza i povrtarske kulture iz kasne poljske proizvodnje. Meteorološki uslovi u ovom periodu će ograničiti razvoj brojnih gljivičnih oboljenja, sa izuzetkom pepelnice na povrtarskim kulturama i voćnim drveću, i pepelnice (oidijuma) na vinovoj lozi.

U julu, ne treba potcenjivati tretmane zaštite bilja u voćnim kulturama protiv druge generacije voćne smotavke, lisnih vaši i grinja. Povoljniji uslovi za izvođenje tretmana zaštite bilja će se javiti većinom dana prve i treće dekade, tokom hladnijih časova dana.

Tokom najtoplijih perioda jula, sa maksimalnim temperaturama do 38-39°C, povećaćе se opasnost od požara tokom žetve žita.

Izvor: RHMZ