

Заштита биља код брескве и кајсије крајем јуна и почетком јула

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



Kod **breskve** nastavlja se prskanje protiv pepelnice, sušice, monilioze, anarsije, istočnjačkog plodnog moljca i lisnih vaši.

Protiv pepelnice koristi se jedan od sledećih fungicida: Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Kozavet DF – 150 g/da, Kumulus DF – 750 g/da, Luna Experience – 50 ml/da, Miklofil – 32-60 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Ritual – 32-60 ml/da, Sercadis – 15 ml/da, Signum WG – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Solfo 80 WG – 750 g/da, Sulgran – 500 g/da, Sulphur WG – 600 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Topaz 100 EC – 50 ml/da, Flosul SC – 500 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da, Heliosulfur C – 125-500

ml/da, Hercules 120 SC – 15-25 ml/da. Od navedenih fungicida, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da su takođe efikasni protiv monilioze i koriste se za istovremenu kontrolu obe bolesti.

Protiv istočnjačkog plodnog moljca i anarsije koristi se jedan od sledećih insekticida: Avant 150 EC – 33.3 ml/da, Affirm Opti – 200-225 g/da, Voliam Targo 063 SC – 75 ml/da, Delegate 250 WG – 30 g/da, Imidan 50 WG – 150 g/da, Coragen 20 SC – 16-30 ml/da, Lamadex Extra – 70 g/da, Meteor – 90 ml/da, Sumi Alpha 5 EC – 0.02%.

Pri visokoj gustini lisnih vaši, prskanje se vrši sa: Pri visokoj gustini lisnih vaši, prskanje se vrši sa: Abanto – 60 ml/da, Ascot WG – 40-80 g/da, Dekka EC/Desha EC/Dena EC/Poleci/Decision – 30-50 ml/da, Decis 100 EC – 8.75-12.25 ml/da, Estrela WG/Lamsha WG/Adalam WG/Indulam WG – 40-80 g/da, Calypso 480 SC – 20 ml/da, Lamadex Extra – 40-60 g/da, Movento 100 SC – 0.075-0.1%, Mospilan 20 SG – 25 g/da, Natur Breaker – 75 ml/da, Proteus O-TEC – 0.05% - 0.06%, Teppeki – 14 g/da.

Kod **kajsije** prskanje se vrši protiv monilioze, gnomoniose, sušice, anarsije i istočnjačkog plodnog moljca. *Protiv monilioze koristi se jedan od sledećih fungicida:* Delan 700 WG – 0.05%, Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum WG – 30 g/da, Systhane 20 EW – 12.5-30 ml/da, Chorus 50 WG – 40-50 g/da. Od naznačenih fungicida, Delan 700 WG – 0.05%, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da i Signum WG – 30 g/da su takođe efikasni protiv gnomoniose. *Protiv anarsije i istočnjačkog plodnog moljca koristi se jedan od insekticida navedenih za breskvu.*

Da bi tretmani protiv bolesti i štetočina u voćnim zasadima bili efikasni, moraju se izvoditi na vreme i kvalitetno. Pored toga, veoma je važno utvrditi neophodnost izvođenja određenog tretmana, što je povezano sa specifičnim monitoringom za utvrđivanje gustine štetočina, a kada se pređu ekonomski pragovi štetnosti, treba izvršiti tretman.