

Агрометеоролошка прогноза за август

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 09.08.2020 Број: 8/2020



Agrotehnički rok za setvu uljane repice počinje u trećoj dekadi avgusta. Kod kasnih sorti voćaka u avgustu ne treba potcenjivati štetnu aktivnost poslednje generacije voćnih crva. Relativno suvo vreme tokom većeg dela meseca biće preduslov za povećanje populacija grinja. U vinogradima je neophodno pratiti pojavu i gustinu gusenica treće generacije evropske vinove loze.

U avgustu će агрометеоролошке uslove određivati temperature i padavine bliske klimatskim normama za ovaj mesec.

Početak avgusta, razvoj kasnih prolećnih useva u većem delu zemlje odvijace se u uslovima produbljivanja deficita vlage u zemljištu. Izuzetak će se zabeležiti na pojedinim mestima u severozapadnoj Bugarskoj i na Sofijskom polju, gde su padavine u julu premašile mesečne norme (Novo Selo - 84 l/m², Vraca - 128 l/m², Montana - 88 l/m², Sofija - 111 l/m², Kjustendil - 72 l/m², Dragoman - 56 l/m²) i povećale nivo rezervi vlage u sloju zemljišta od 50 i 100 cm. U zapadnim regionima zemlje, predviđene padavine u drugoj polovini prve dekade avgusta obezbediće vlagu za vegetaciju kasnijih hibrida kukuruza i drugih useva.

U istočnoj Bugarskoj i južnim regionima, padavine se ne očekuju tokom prve dekade avgusta, a na pojedinim mestima produbljivanje suše dovedeće u pitanje žetvu prolećnih useva gajenih u nezaplavnim uslovima. U nekim od ovih regiona, kao posledica oskudnih julskih padavina - na mestima ispod 2-3 l/m² (Ruse, Šabla, Stara Zagora, Sliven, Karnobat, Burgas, Haskovo, Kardžali), rezerve vlage u zemljištu u sloju od 50 i 100 cm su potpuno iscrpljene (agrometeorološka stanica Sliven).

Do sredine avgusta, predviđene visoke temperature, sa maksimalnim vrednostima do 36-38°C, dovest će do skraćenja interfaznih perioda u razvoju kasnih ratarskih useva. Vrednosti ovog reda, u kombinaciji sa niskom vlažnošću vazduha, imaće negativan uticaj na cvetanje i oplodnju kod povrtarskih kultura iz kasne ratarske proizvodnje.

Tokom prve dekade avgusta, raniji hibridi kukuruza završice svoj razvoj, a srednje rani hibridi ući će u fazu mlečne zrelosti. Kod suncokreta u Podunavlju i južnim regionima, zabeležiće se faza sazrevanja. Krajem druge i početkom treće dekade u ratarskim regionima, suncokret će uglavnom biti u fazi tehničke zrelosti. Tokom treće dekade, srednje kasni hibridi kukuruza ući će u fazu voštane zrelosti. Kod pirinča zabeležiće se faza mlečne zrelosti, kod soje faza sazrevanja, a kod pamuka početak otvaranja mahuna.

Za drugu polovinu treće dekade predviđa se verovatnoća padavina, poboljšanja vodno-fizičkog stanja zemljišta u gornjim slojevima i uslova za izvođenje predsetvene obrade površina predviđenih za setvu ozime uljane repice. Agrotehnički rok za setvu uljane repice počinje u trećoj dekadi avgusta.

Kod kasnih sorti voćaka u avgustu ne treba potcenjivati štetnu aktivnost poslednje generacije voćnih crva. Relativno suvo vreme tokom većeg dela meseca biće preduslov za povećanje populacija grinja. U vinogradima je neophodno pratiti pojavu i gustinu gusenica treće generacije evropske vinove loze. Zaštitno prskanje biljaka treba sprovoditi tokom hladnijih sati u danu proizvodima koji imaju odgovarajući prethodni rok do žetve, u skladu sa periodom sazrevanja useva.

Izvor: NIMH