

Агрометеоролошка прогноза за септембар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.09.2020 Брой: 9/2020



U septembru će se agrometeorološki uslovi u zapadnoj Bugarskoj takođe značajno razlikovati od onih u istočnim regionima zemlje.

U istočnoj Bugarskoj oni će biti određeni iznadprosečnim temperaturama i ispodprosečnim padavinama. Na mnogim mestima u istočnim regionima, kao posledica produžene letnje suše, prolećni usepi su prerano završili vegetaciju. U ovim oblastima, žetva suncokreta i ranijih hibrida kukuruza započela je ranije od uobičajenih rokova, sa prinosima znatno ispod proseka zemlje.

U septembru će se u većini zapadnih regiona završne faze razvoja kasnih poljoprivrednih usepa odvijati pod iznadprosečnim temperaturama, sa padavinama bliskim klimatskim normama i sa dobrim rezervama vlage u

zemljištu na kraju leta u slojevima od 50 i 100 cm (preko 70% poljskog vodnog kapaciteta – Nikolaevo, Kyustendil, Sandanski) – kao rezultat iznadprosečnih padavina u avgustu (Vidin – 67 l/m², Lom – 80 l/m², Sofija – 84 l/m², Kyustendil – 98 l/m², Blagoevgrad – 152 l/m², Sandanski – 107 l/m²).

Tokom prve dekade septembra, ponovo se predviđaju padavine agronomskog značaja za zapadnu polovinu zemlje. One će imati povoljan uticaj na druge usepe i kasne hibride kukuruza, koji će biti u fazi mlečne zrelosti. Tokom ove dekade, na poljskim površinama srednje kasni hibridi će ući u fazu voskaste zrelosti. Do sredine meseca, deo kasnih hibrida će završiti svoj razvoj. Tokom druge dekade, pirinač će biti u fazi voskaste i pune zrelosti. Tokom treće dekade, faza sazrevanja će se javiti kod pamuka, kikirikija, jesenjih sorti voćaka i kasnijih sorti grožđa. Za mesec, predviđene minimalne temperature su iznad kritičnih pragova za povrtarske kulture, što je preduslov za dobijanje dodatne povrtarske proizvodnje iz kasnog poljskog gajenja.

Većinu dana druge i treće dekade očekuje se relativno suvo vreme i uslovi će biti pogodni za čišćenje površina od prolećnih usepa.

Takođe u septembru, u većem delu istočnih regiona, nedostatak vlage u gornjim slojevima zemljišta će ometati kvalitetno izvođenje duboke orače i predsetvene obrade površina predviđenih za setvu ozimog uljane repice i ozimih žitara. Optimalni vremenski okvir za setvu uljane repice je do kraja druge dekade meseca. U trećoj dekadi, na poljima na višim nadmorskim visinama počinju agrotehnički rokovi setve ječma i pšenice.

Izvor: NIMH