

Топла и сува јесен нас чека у октобру

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 06.10.2020 Брой: 10/2020



Na početku jeseni, nakon produžene suše, agrometeorološki uslovi doživeli su pozitivnu promenu. Padavine, koje su u mnogim delovima zemlje premašile 20–30 l/m² (Vraca, Kneža, Oriahovo, Sofija, Dragoman, Kjustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Kazanlak, Kardžali, Elhovo, Razgrad, Burgas), povećale su vlažnost u gornjim slojevima zemljišta, što je od velikog značaja za pravilno izvođenje sezonske obrade zemljišta. Izuzetci postoje u delovima Tračke nizije i u istočnim regionima, gde su padavine krajem septembra bile bez ekonomskog značaja.

U oktobru će agrometeorološke uslove određivati temperature iznad klimatskih normi i padavine ispod mesečne norme.

Tokom prve dekade, značajnije padavine se ne predviđaju i u većini ratarskih područja uslovi će omogućiti izvođenje predsetvene obrade i setvu jesenjih useva. Ove godine suša je ometala setvu ozimog uljane repice i veliki deo planiranih površina biće posejan u oktobru – nakon agrotehničkih rokova. Povećana je verovatnoća da

kasnije posejani usevi neće moći da formiraju rozetu (7–8 listova) do kraja svoje jesenje vegetacije, što je faza u kojoj uljana repica uspešno prezimljava.

Oktobar je optimalan period za setvu ozimih žitatih useva. U prvoj polovini meseca je agrotehnički rok za setvu pšenice u Severnoj Bugarskoj, u drugoj polovini – za Južnu Bugarsku, a u trećoj dekadi – za područja duž crnomorske obale.

Tokom prve dekade, predviđene sezonski visoke temperature, sa maksimalnim vrednostima do 25–30°C, ubrzaće zrenje kasnih sorti vinove loze i obezbediće uslove za dobijanje dodatne proizvodnje od povrtarskih kultura kasne poljske proizvodnje.

Nakon neuobičajeno toplog vremena u drugoj polovini oktobra, očekuje se postepena normalizacija toplotnih uslova. Predviđene padavine tokom druge i prve polovine treće dekade biće od velikog značaja za normalan tok početnih faza vegetacije posejanih jesenjih useva. Krajem oktobra, u zavisnosti od rokova setve, kod pšenice će se zapažati sledeće faze: nicanje, treći list i početak klasanja kod najranije posejanih useva, posejanih početkom oktobra.

Predviđene temperature iznad normale tokom meseca stvoriće uslove za povećanje populacije određenih štetočina – obične voluharice. U oktobru je neophodno pratiti jesenje useve i, kada populacija voluharica pređe prag ekonomske štete (2 aktivne kolonije po dekaru), neophodna je kontrola odobrenim rodenticidima (Phostoxin peleti) – otrovnim mamcima koji se postavljaju na ulaze u kolonije.

Većinu dana u mesecu, uslovi će biti pogodni za berbu voća. U zasadima jabuke i kruške zahvaćenim parom, radi smanjenja inokuluma, preporučljivo je, na početku opadanja lišća, nakon berbe plodova, izvršiti tretman sa 5% rastvorom uree.

Za koštuničave vrste, nakon masovnog opadanja lišća, preporučuje se prskanje sa 2% bordoa smesom protiv uzročnika rupičavosti lišća, rane smeđe truleži, kovrdžavosti lišća breskve i sl.

Izvor: NIMH