

Proveravajte useve redovno na prisustvo poljskog vola tokom oktobra i novembra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2020 Брой: 10/2020



U oktobru i novembru, jesenje useve je neophodno pregledati i, kada gustina populacije štetočine obične voluharice pređe prag ekonomske štete (2 aktivne kolonije po dekaru), neophodne su mere suzbijanja.

Обічна voluharica (*Microtus agrestis*) – rasprostranjena je na celoj teritoriji zemlje. Nanosi štetu žitaricama, lucerki, uljanoj repici, voćnjacima, itd. Živi u kolonijama u dugačkim hodnicima sa različitim brojem otvora na površini zemljišta. Naseljene kolonije se prepoznaju po razbacanim gomilama zemlje, dobro oblikovanom otvoru i zelenom lišću unetom u njega. U toplim i suvim zimama, reproduktivna sposobnost voluharice je veoma visoka. Razmnožava se tokom cele godine, a potomstvo od jednog para može dostići do 2400 jedinki. Hrani se zelenim delovima biljke. Šteta se primećuje od nicanja useva pa do žetve. U slučajevima jakog napada, usev postaje

proređen. Posle žetve preporučuje se duboka ora radi uništavanja kolonija i eliminacije eventualno nicali korovske vegetacije koja služi voluharici kao hrana. Tokom terenskih pregleda utvrđuje se gustina populacije voluharice, a kada su prisutne 2 aktivne kolonije po dekaru, u otvore (naseljene) stavljaju se otrovne mamci i nogom prikisle kako bi se zaštitile ptice i korisna divljač. Tretman se sprovodi rodenticidima odobrenim za tu namenu (Phostoxin pelete) – otrovnim mamcima koji se postavljaju na ulaze u kolonije.