

Заштита винове лозе и воћних врста у јесен

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 03.11.2020 Брой: 11/2020



Vrste voća

Jabuke i kruške

U većini dana oktobra, uslovi će biti pogodni za berbu voća. U zasadima jabuka i krušaka zahvaćenim parom, kako bi se smanjila infekcija, preporučuje se, na početku opadanja lišća i nakon što je voće ubrano, izvršiti tretman sa 5% rastvorom uree. Nakon temeljnog pregleda i otkrivanja kasnih infekcija, kao i protiv bolesti koje se razvijaju tokom skladištenja proizvoda, vrši se tretman sa Topsin M 70 WDG - 0,1% ili Top Plus 70 WP - 0,1%. Za dobro skladištenje jabuka i krušaka i za smanjenje truleži i propadanja tokom skladištenja, takođe se

preporučuje izvršiti jedan post-berbeni tretman sa Topsin M 70 WG - 0,120%. Nakon prskanja, plodovi se ostavljaju da se osuše, a zatim slažu u hladnjače ili duboke i prohladne podrumске просторије.

Koštuničavo voće

Za koštuničavo voće, nakon masovnog opadanja lišća, preporučuje se prskanje sa 2% bordoskom mešavinom protiv uzročnika rupičavosti lišća, rane smeđe truleži, kovrdžavosti lišća breskve i slično.

Pod ovim klimatskim uslovima, okruženje je takođe povoljno za pojavu i razmnožavanje višegeneracijskih insekata i grinja. Oni razvijaju svoje poslednje generacije, čija će gustina populacije u velikoj meri odrediti štetu tokom naredne godine. Tokom meseca, stvaraju se uslovi za formiranje obilne rose, koja je uzrok kasnih infekcija plamenjače na kasnim paradajzima i drugima.

Vinogradi

U ovom periodu, siva trulež (Botrytis trulež grozda) nanosi značajnu štetu vinovoj lozi od bojenja bobica pa sve do potrošnje. Stoga, u vlažnom i hladnom vremenu, vrši se tretman sa Topsin M 70 WDG - 0,2%, Switch 62.5 WG – 100 g/ha, Shavit F 72 WDG – 0,2% (200 g/ha), Quadris 25 SC – 0,075%.

U ovo vreme lete i odrasle jedinke treće generacije grozdane moljca. Larve nanose štetu zrelim ili već zrelim bobicama grožđa. Za suzbijanje štetočine, registrovanom piretroidu se dodaje u rastvor fungicida za prskanje.

Jednogodišnji izdanci vinove loze se prekrivaju zemljom 3–5 cm iznad mesta kalemljenja i tako se pripremaju za zimski period.

Saglasno Zakonu o zaštiti bilja, poljoprivrednici su dužni da koriste samo sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za upotrebu za odgovarajući usev i štetočinu, i u odgovarajućoj dozi.