

'Padavine i pogodni uslovi za sadnju voćaka u novembru'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.11.2020 Брой: 11/2020



Nakon produžene suše, iznadnormalne padavine u oktobru, koje su na pojedinim mestima u Severnoj Bugarskoj premašile 70-80 l/m² (N. selo - 72 l/m², Montana - 71 l/m², Knezha - 80 l/m², Pleven - 94 l/m², Lovech - 79 l/m², Dobrich - 75 l/m²), dovele su do značajnog povećanja rezervi vlage u gornjim slojevima zemljišta i poboljšanja uslova za napredovanje početnih faza vegetacije posejanih jesenjih useva. Krajem oktobra, na agrometeorološkim stanicama Silistra, Knezha, Sofia, Kyustendil, Novachene, Nikolaevo, Pavlikeni, Borima, Kazanlak, Pazardzhik, Plovdiv, u sloju od 50 cm za ozime žitarice nivoi su dostigli i premašili 75-80% poljskog vodnog kapaciteta.

U novembru, predviđene padavine, oko i iznad mesečne norme, povećaće jesenje rezerve vlage u slojevima zemljišta od 50 i 100 cm.

Tokom prve polovine novembra, razvoj ozimih žitarica i ozime uljane repice odviјаće se umerenim tempom, na temperaturama bliskim klimatskim normama. U ovom periodu, kod pšenice, u zavisnosti od vremena setve, primećuju se različite faze – nicanje, treći list i klasanje kod ranije posejanih useva, krajem septembra i početkom oktobra.

Krajem druge dekade predviđeno je zahlađenje i značajna promena agrometeoroloških uslova. Na višim poljima, gde padavine u obliku snega nisu isključene, primećuje se prestanak vegetativnih procesa kod jesenjih useva.

Tokom treće dekade novembra, razvoj useva u većini poljoprivrednih regiona odviјаće se usporenim tempom, na temperaturama bliskim biološkom minimumu potrebnom za vegetaciju ozimih žitarica. Uslovi za aktivnije vegetativne procese kod pšenice, ječma i ozime uljane repice stvoriće se u južnim i jugoistočnim regionima zemlje. Krajem novembra, usevi pšenice i ječma u fazi trećeg lista će biti dominantni.

Ove godine suša je ometala pravovremenu setvu ozime uljane repice. Iz tog razloga, do kraja novembra samo deo useva, uglavnom onih posejanih početkom jeseni, pokazaće početak faze formiranja rozete (5-6 listova).

U novembru, predviđene minimalne temperature, do minus 7°C, su iznad kritičnih nivoa za jesenje useve koji su u početnoj fazi svog razvoja.

Pogodniji uslovi za sadnju voćaka javiće se tokom prve polovine meseca.

Izvor: NIMH