

Агрометеоролошка прогноза за крај новембра и почетак децембра

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2020 Брой: 11/2020



Krajem novembra, zemlja se probudila pod snežnim pokrivačem. Prošle noći prvi снег ove sezone pao je u zapadnoj Bugarskoj. Temperature su pale ispod nule, zbog čega su padavine u Sofiji, Razgradu, Perniku i Kjustendilu prešle u снег. Očekuje se da će snežni pokrivač dostići do 5 cm, osim u Podunavskoj ravnici, где će njegova dubina biti između 10–15, a na pojedinim mestima i do 20 cm.

Krajem novembra i početkom decembra, agrometeorološki uslovi će biti sve dinamičniji. Na početku perioda odrediće ih blago vreme za sezonu, sa prosečnim dnevnim temperaturama u većini ratarskih područja oko i iznad biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju ozimih žitarica i ozime uljane repice.

Tokom ovog perioda, predviđa se značajan pad temperatura i promena agrometeoroloških uslova. Očekivano hlađenje dovest će do usporavanja, a na višim poljima i Predbalkanu, gde se predviđaju padavine uključujući i sneg, do prestanka vegetativnih procesa kod jesenje setih useva. Izuzetak će se javiti na pojedinim mestima u jugoistočnim regionima i duž crnomorske obale, gde će se uočiti slabo izražena vegetacija ozimih žitarica.

Početkom decembra, u usevima pšenice posejanim u agrotehničkom roku, u oktobru, uočiće se faza busanja, u kojoj ozime žitarice uspešno prezimljuju. Faza trećeg lista će prevladavati u usevima posejanim početkom novembra. Kasno posejani usevi, sredinom novembra, nisu dobro formirani i nalaze se u fazi nicanja i početnog formiranja listova. Kod uljane repice, faza rozete, pogodna faza za prezimljavanje, uočiće se u usevima posejanim početkom jeseni.

Tokom narednog perioda, očekuju se padavine i poboljšanje rezervi vlage u zemljištu u gornjim slojevima zemljišta. Kao rezultat padavina ispod normale u novembru, rezerve vlage u zemljištu u slojevima od 50 i 100 cm u usevima pšenice u većem delu zemlje su neobično niske za ovu sezonu – na pojedinim mestima u istočnim i krajnjim južnim regionima ispod 60% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke stanice Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

Na početku narednog perioda, uslovi će biti pogodni za sadnju voćaka i za izvođenje jesenjeg tretmana zaštite bilja u voćnim zasadima.

Za zaštitu voćnih kultura od zimskih hladnoća, uništavanje lišajeva i mahovina, te odbijanje mramorastog štíčnika i leopard moljca, neophodno je tretirati stabla i debelo granje drveća sa 20% krečnim mlekom u koje se dodaje mala količina gline.

Izvor: NIMH