

Агрометеоролошка прогноза за децембар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.12.2020 Брой: 12/2020



Početkom decembra agrometeorološke uslove će odrediti temperature ispod normale. Očekivani hladni talas dovesti će do usporavanja, a u Severnoj Bugarskoj i na visokim poljima, do prestanka vegetativnih procesa kod ozimih žitarica i uljane repice.

Tokom prve dekade, uslovi će omogućiti izvođenje sezonskih obrada zemljišta (duboko oranje površina predviđenih za prolećnu setvu) i fitosanitarnih aktivnosti u višegodišnjim usevima. Sredinom perioda, predviđeni su rasprostranjene padavine i poboljšanje vlažnosti zemljišta.

Tokom druge polovine prve dekade, predviđen je značajan porast temperatura, ali njihove prosečne dnevne vrednosti, sa izuzetkom nekih mesta u jugoistočnim regionima i duž crnomorske obale, neće dostići biološki

minimum neophodan za vegetaciju jesenje setvenih useva.

Tokom većine dana druge i treće dekade, predviđene temperature, oko i iznad klimatskih normi, zadržaće ozime žitarice u stanju mirovanja u većem delu zemlje. Izuzeci su mogući za pšenicu i ječam u krajnjim južnim i jugoistočnim regionima. U ovim regionima, tokom relativno toplijih perioda, primećen će biti kratkotrajan nastavak vegetativnih procesa kod jesenje setvenih useva, ali ne očekuje se promena fenoloških faza useva.

Na početku zime, kod pšenice, kao rezultat odložene jesenje setve i produbljenog deficita vode u zemljištu u novembru, primećene će biti različite faze. Kod ozimih žitarica posejanih u oktobru u okviru agrotehničkog roka, dominiraće faza busanja. Usevi posejani početkom novembra prezimiće u fazi trećeg lista, dok će oni kasno posejani, u drugoj polovini novembra, biti u fazi nicanja i početnog formiranja listova. Kod uljane repice, samo je deo useva uspeo, tokom svoje jesenje vegetacije, da formira rozetu, fazu u kojoj biljke uspešno prezimljavaju.

U decembru, predviđene vrednosti minimalnih temperatura, do minus 11°C, u uslovima bez snežnog pokrivača i sa dužim trajanjem, biće kritične za ozime žitarice koje su u fazi nicanja.

Očekivane padavine u decembru, oko mesečne norme, povećaće rezerve vlage u zemljištu u sloju od 50 i 100 cm. Kao rezultat padavina ispod normale u novembru, u mnogim delovima zemlje reda 6–7 l/m², nivo rezervi vlage u zemljištu kod ozimih žitarica je neobično nizak za drugu polovinu jeseni. Na nekim mestima u Južnoj Bugarskoj i u delu istočnih regiona, one su ispod 60% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke stanice Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

Izvor: NIMH