

Агрометеоролошка прогноза на почетку године

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.01.2021 Брой: 1/2021



Iznadnormalne decembarske temperature, sa maksimalnim vrednostima od 17-18°C na mnogim mestima u nizijским predelima (Kneža, Pleven, Loveč, Veliko Trnovo, Ruse, Silistra, Pazardžik, Plovdiv, Stara Zagora, Čirpan, Elhovo, Varna, Burgas), produžile su vegetativne procese u jesenjim usevima. Neobično visoke temperature pokrenule su prevremeno bubrenje pupoljaka kod nekih ranocvetnih voćnih vrsta (breskva, trešnja), što će dovesti do smanjenja njihove otpornosti na hladnoću.

Tokom prve dekade januara, agrometeorološki uslovi će biti određeni iznadnormalnim temperaturama. Na početku meseca, na mnogim mestima u nizijским predelima, njihove srednje dnevne vrednosti ponovo će premašiti biološki minimum neophodan za vegetaciju ozimih žitatica.

Hlađenje i prestanak vegetativnih procesa u jesenjim usevima očekuju se tokom druge polovine prve dekade.

Tokom druge i treće dekade, predviđene temperature, bliske klimatskim normama, održavaće ozime žitarice i uljanu repicu u stanju mirovanja. Očekivani rasprostranjeni sneg poboljšaće uslove prezimljavanja jesenjih useva. Pšenica je ušla u zimu u različitim fenološkim fazama, kao posledica produžene jesenje suše i odložene setve. Kasno posejane ozime žitarice, posejane krajem jeseni, nisu dobro formirane i nalaze se u fazama nicanja i ranog formiranja listova na nekim mestima u južnim regionima zemlje (agrometeorološke stanice – Plovdiv, Haskovo, Ljubimec, Sliven, Jagodina). Značajan deo useva pšenice će prezimiti u fazi tri lista. U fazi busanja, koja je pogodna faza za prezimljavanje, nalaze se ozime žitarice posejane u okviru optimalnog agrotehničkog roka (agrometeorološke stanice – Bazovec, Novočene, Pavlikeni, Trgovište, Sandanski, Pazardžik, Karnobat, Donji Čiflik).

U januaru, predviđene minimalne temperature, do minus 15°C, u uslovima bez snežnog pokrivača i sa dužim trajanjem, biće kritične za neizbujanale ozime žitarice i za useve ozime uljane repice koji nisu uspeli da formiraju rozetu tokom svoje jesenje vegetacije.

Očekivane padavine u januaru, oko i iznad normale, povećaće rezerve vlage u zemljištu u sloju od 100 cm. Iznadnormalne padavine u decembru (Kardžali – 194 l/m², Haskovo – 142 l/m², Sliven – 125 l/m², Stara Zagora – 123 l/m², Silistra – 109 l/m²) naglo su povećale rezerve vlage u gornjim slojevima zemljišta. Na početku zime, u usevima pšenice, rezerve vlage u zemljištu u sloju od 50 cm u većini nizijskih predela dostigle su nivo iznad 85-90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

U januaru, pogodniji uslovi za izvođenje zimskog rezidbe u vinogradima i voćnjacima nastupiće tokom treće dekade.

Izvor: RHMZ