

Агрометеоролошка прогноза за февруар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2021 Брой: 2/2021



Tokom prve februarske dekade, agrometeorološki uslovi će biti određeni iznadprosečnim temperaturama, a na mnogim mestima u nizijskim predelima njihove prosečne dnevne vrednosti će dostići biološki minimum neophodan za nastavak vegetativnih procesa kod ozimih žitarica.

Krajem prve i početkom druge dekade, očekuje se pad temperatura, koji će sprečiti preuranjenu vegetaciju kod jesenje posejanih useva i kod nekih ranocvetnih koštičavih vrsta voćaka u nizijskim predelima zemlje. Tokom druge dekade, prognozirane prosečne dnevne temperature biće blizu klimatskih normi i održavaće poljoprivredne useve u toku zimovanja u stanju mirovanja.

Tokom treće dekade, agrometeorološki uslovi ponovo će biti određeni iznadprosečnim temperaturama, koje će poremetiti relativno mirovanje jesenje posejanih useva i usiljeno mirovanje nekih ranocvetnih voćnih kultura. Krajem februara, kod ozimih žitarica na pojedinim mestima u južnoj Bugarskoj i duž crnomorske obale, stvoriće se uslovi za zakasnelu vegetaciju, ali se ne očekuje značajnija promena fenološkog statusa useva. Kod pšenice, primećivaće se faza trećeg lista i busanja. U krajnje južnim i jugoistočnim regionima, kod nekih ranocvetnih koštičavih vrsta (badem, breskva, trešnja), doći će do nabubrenja pupoljaka, a na pojedinim mestima i do početka pucanja pupoljaka.

U februaru, prognozirane vrednosti minimalnih temperatura, do minus 12-13°C, u uslovima bez snežnog pokrivača i pri dužem trajanju, predstavljaju rizik za kasno posejane ozime žitarice koje su zaustavile vegetaciju u fazi 2-3 lista, i za useve uljane repice koji nisu uspeali da formiraju rozetu tokom jesenje vegetacije.

Očekivane padavine tokom meseca, oko i iznad normale, povećaće rezerve vlage u dvometarskom sloju zemljišta. Kao rezultat iznadprosečnih januarskih padavina, koje su na mnogim mestima u zemlji premašile 140-150 l/m² (Vraca -146 l/m², Šumen -147 l/m², Varna -154 l/m², Dragoman -158 l/m², Blagoevgrad -145 l/m², Sandanski -151 l/m², Haskovo -146 l/m², Kardžali -176 l/m², Elhovo -163 l/m², Burgas -185 l/m²), rezerve zemljišne vlage u jednometarskom sloju kod ozimih žitarica dostigle su nivo blizak poljskom vodnom kapacitetu (PVK).

Tokom prve i druge februarske dekade, visok sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta ograničavaće mogućnosti za izvođenje pojedinih agrotehničkih aktivnosti – prihranjivanje jesenje posejanih useva azotnim mineralnim đubrivima, predsetvena obrada površina namenjenih setvi ranih prolećnih useva (grašak, grahorica, ovas, jarni ječam). Pogodniji uslovi za rezidbu u vinogradima i voćnjacima, i za zimsko zaštitno prskanje u voćnjacima, biće dostupni većinom dana prve i treće februarske dekade.

Izvor: NIMH