

# Kalifornijska štitasta vaš - *Quadraspidiotus perniciosus* Comst

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 24.02.2021 Брой: 2/2021



## Šteta:

Stjenica siše biljni sok sa kore debla, grana, grančica, plodova i listova;

Pri jakoj infestaciji kora puca i odumire, pojedine grane se suše, a kasnije odumire i celo stablo;

Na grančicama i plodovima, na mestu oštećenja, nastaju vinskocrvene do ljubičaste mrlje, listovi opadaju, izbojci se deformišu, kora na grančicama puca, a plodovi gube tržišni izgled.

Štetnik napada oko 200 biljnih vrsta – izazivajući ozbiljnu štetu na jabuci, kruški, šljivi, breskvi i kajsiji.

Prezimi kao larva prvog stupnja na kori grančica i debla, koja završava svoj razvoj tokom cvetanja jabuke.

Širi se sadnim materijalom.

## **Suzbijanje:**

Tokom perioda mirovanja, mere suzbijanja su usmerene protiv prezimljavajućeg stadijuma – larvi;

Do nabubrenja pupoljaka jabuke i kruške, treba izvršiti tretman biljnim zaštitnim uljem, koje deluje gušenjem – stvara uljni film koji prekriva ljušturu prezimljavajuće larve i uskraćuje joj kiseonik, usled čega ona ugiba;

Prilikom tretmana biljnim zaštitnim uljem, uništavaju se i prezimljavajuća jaja crvene voćne grinje, pri utvrđenoj gustini od 60–80 prezimljavajućih jaja po 10 cm grančice kod jabuke i 40–50 jaja po 10 cm grančice kod kruške, kao i obezbeđuje delovanje protiv stjenica, buva, pipa, itd.;

Proizvod se može dodati u fungicidni prskavi rastvor ili koristiti samostalno.