

# Агрометеоролошка прогноза за март

Автор(и): Растителна заштита  
Дата: 03.03.2021 Број: 3/2021



Nakon kratkotrajnog hladnog talasa početkom marta, tokom većine dana prve polovine meseca agrometeorološke uslove će odreditи temperature bliske klimatskim normama i biološkom minimumu neophodnom za razvoj ozimih žitara. Tokom ovog perioda, u južnim regionima zemlje stvoriće se uslovi za početak vegetacije u jesenjim usevima.

Za drugu polovinu druge dekade predviđa se značajan porast temperatura i aktiviranje vegetativnih procesa kod ozimih žitara i višegodišnjih zasada.

Tokom treće dekade razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati ubrzanim tempom, pod toplotnim uslovima iznad normale. Krajem meseca, pšenica i ječam će uglavnom biti u fazi busanja, sa prelazom na fazu izdizanja stabila

u usevima u nekim južnim i jugoistočnim regionima zemlje. Kod ozimog uljane repice koja je prezimila u fazi rozete, masovno će se odvijati grananje.

U martu će se kod voćaka moći uočiti različite fenološke faze – od bubrenja pupoljaka i pucanja pupoljaka do faza zelenog grozda i cvetanja kod ranocvetajućih koštičavih vrsta – badema, kajsije, breskve, u južnim regionima i pojedinim mestima u Podunavlju, gde su temperature iznad normale u februaru izazvale prevremeni razvoj u voćnjacima.

U martu, predviđene minimalne temperature, do minus 7°C, predstavljaju rizik za najnaprednije voćke u fazama formiranja pupoljaka i cvetanja.

Očekivane padavine u martu, bliske mesečnoj normi, povećaju rezerve vlage u zemljištu čak i u dvometarskom sloju. Krajem februara, u većini ratarskih regiona rezerve vlage u jednometarskom sloju pod ozimim žitaricama bile su na nivou bliskom poljskom vodnom kapacitetu. Izuzetci su uočeni na pojedinim mestima u Podunavlju – agrometeorološke stanice: Bazovets, Novachene, Pavlikeni, i u jugoistočnim regionima – agrometeorološke stanice: Sliven, Karnobat, Dolni Chiflik, gde su rezerve vlage u jednometarskom sloju zemljišta pod pšenicom bile ispod 90% poljskog vodnog kapaciteta.

U martu, povoljni uslovi za obavljanje sezonskih agrotehničkih aktivnosti – predsetvene obrade zemljišta i setve ranih i srednje ranih jarih useva (grahorice, ovsa, jarih ječmova, graška); preventivnih tretmana pre cvetanja u voćnjacima protiv brojnih bolesti – plamenjače cvetova (rane smeđe truleži), rupičavosti lišća, kovrdžavosti lišća breskve, parši, itd., biće prisutni tokom većine dana prve i tokom druge polovine treće dekade.

Predviđene česte padavine tokom druge i prve polovine treće dekade marta održavaće visok sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta i zbog toga će na pojedinim mestima u južnim regionima agrotehnički rokovi za setvu suncokreta biti propušteni. Optimalni period za setvu suncokreta u južnoj Bugarskoj je između 15. i 20. marta, a u Podunavlju počinje sredinom treće dekade meseca (25.03–5.04).

*Izvor: NIMH*