

Kritične temperature za ranocvetne vrste koštičavog voća

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2021 *Брой:* 3/2021



Kasni zimski vremenski događaji na kraju prve i početkom druge dekade marta prekinuli su vegetacione procese jesenjih useva u velikom delu ratarskih regiona zemlje i ozbiljno su testirali voćne kulture koje su naprednije u svom razvoju. Na nekim mestima u Podunavlju i u južnim regionima (Plovdiv, Stara Zagora, Čirpan) zabeležene su minimalne temperature do minus 6-7°C, što je kritično za neke od voćaka koje su ušle u faze pupanja i cvetanja – badem, kajsija i breskva.

U drugoj polovini marta predviđene su negativne minimalne temperature i povećan rizik od oštećenja ranocvetajućih vrsta koštičavog voća.

Do kraja druge dekade agrometeorološki uslovi biće veoma dinamični. Nakon kratkog zagrevanja i topljenja snega sredinom marta, za drugu polovinu perioda predviđene su temperature ispod normale, što će kočiti razvoj poljoprivrednih useva. Izuzetci se očekuju u krajnje južnim regionima, gde će prosečne dnevne temperature dostići i premašiti biološki minimum neophodan za vegetaciju ozimih žitatica. Na kraju zime, usevi pšenice će uglavnom biti u fazi busanja.

Tokom narednog perioda očekuju se značajne padavine i povećanje zaliha vlage u zemljištu u sloju od 100 cm. U većini ratarskih regiona, za ozime žitarice, one će dostići nivo iznad 90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Tokom perioda uslovi će biti nepogodni za obavljanje sezonskih obrada zemljišta i za setvu ranih i srednje ranih prolećnih useva. Velika je verovatnoća da će agrotehnički rokovi za setvu suncokreta u južnoj Bugarskoj, koji počinju sredinom marta, biti propušteni.

Izvor: NIMH