

Početkom aprila, uočava se aktivno napredovanje vegetacionih procesa u poljoprivrednim usevima.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.04.2021 Брой: 4/2021



Uprkos očekivanom snegu u planinama i predviđenom hlađenju na početku aprila, agrometeorološki uslovi će biti određeni prosečnim dnevnim temperaturama koje će omogućiti aktivan tok vegetacionih procesa u poljoprivrednim usevima. Na početku aprila ne predviđaju se kritične minimalne temperature za voćne vrste koje su uznapredovale u svom fenološkom razvoju.

Tokom perioda, pšenica i ječam u južnoj Bugarskoj će se nalaziti u fazi izdizanja stabiljke. U usevima u Podunavskoj ravnici, odvijaće se faza busanja, prelazak u izdizanje stabiljke i početak izdizanja stabiljke. Kod

voćnih vrsta, primećene fenološke faze će biti pucanje pupoljaka, nalivanje pupoljaka i cvetanje. Kod vinove loze, odvijaće se sokotok i bujanje pupoljaka.

Tokom perioda, stvoriće se uslovi za izvođenje sezonskih agrotehničkih operacija – setve suncokreta i predsetvenih priprema zemljišta za prolećne useve. U trajnim zasadima, nastaviće se tretmani protiv parši kod jabučastih vrsta, protiv uvenuća cvetova (rana braon trulež) i rupičavosti lišća kod koštičavih vrsta, i kovrdžavosti lišća breskve. Da bi se postigao maksimalan efekat prskanja, aktivnosti zaštite biljaka treba sprovoditi pri mirnom vremenu sa dozvoljenom brzinom vetra do 2–3 m/s.

Predviđene padavine tokom prvih dana perioda privremeno će ograničiti mogućnosti za izvođenje agrotehničkih aktivnosti.

Izvor: NIMH