

Агрометеоролошка прогноза за месец април

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2021 Брой: 4/2021



Tokom prve april ske dekade, agrometeorološki uslovi će biti određeni temperaturama iznad klimatskih normi. Prognozirani iznadnormalni termički uslovi ubrzaće vegetacione procese ozimih žitatica, a veliki deo useva na ratarskim površinama masovno će ući u fazu izbijanja stabila. Kod uljane repice, primećivaće se grananje i početak faze formiranja pupoljaka.

Tokom većeg broja dana dekade, ne očekuju se značajnije padavine i uslovi u mnogim delovima zemlje omogućiće izvođenje predsetvenih obrada i setvu suncokreta. Prva april ska dekada predstavlja agrotehnički rok za setvu suncokreta u severnoj Bugarskoj.

Krajem prve i početkom druge dekade, prognozira se snižavanje temperatura, stabilizacija vremena i značajna promena agrometeoroloških uslova. U tom periodu očekuju se značajne padavine i povećanje zaliha vlage u zemljištu, uključujući i u dvometarskom sloju. Početkom proleća, na većini ratarskih površina, zalihe vlage u zemljištu za pšenicu u jednometarskom sloju dostigle su nivo iznad 90% poljskog vodnog kapaciteta. Izuzetak su pojedini istočni regioni – agro-stanice Razgrad, Dolni Čiflik, Sliven – gde je nivo zaliha vlage niži, ispod 80% poljskog vodnog kapaciteta.

Krajem prve i početkom druge april ske dekade, prognozira se kratkotrajna stabilizacija vremena i pogodni uslovi za izvođenje određenih hitnih zaštitnih tretmana u voćnjacima: u fazi cvetnih pupoljaka kod koštičavog voća (jabuka, kruška) protiv parši; postcvetni tretmani kod nekih ranocvetnih koštuničavih vrsta protiv uvenuća cvetova (rana smeđa trulež) i rupičavosti lišća; kod trešnje i višnje protiv najopasnije gljivične bolesti – cilindrosporioze (tzv. bele rđe), i drugih.

Tokom druge april ske dekade, razvoj poljoprivrednih useva odvijaće se sporijim tempom, pod ispodnormalnim termičkim uslovima. Krajem dekade, prognozira se povećana verovatnoća pojave mraza, što treba uzeti u obzir pri otvrdnjavanju rasada povrća i duvana. Prognozirane minimalne temperature, na pojedinim mestima do minus 2–3°C, biće kritične za cvetove i mlade plodove voćaka ako se zadrže duže vreme.

Početkom treće dekade, očekuje se zagrevanje i na ratarskim površinama temperature zemljišta u desetocentimetarskom sloju dostići će pogodne vrednosti za setvu kukuruza.

Tokom treće april ske dekade, vegetacija poljoprivrednih useva odvijaće se umerenim tempom pri temperaturama bliskim klimatskim normama. U ovom periodu, kod ozimih žitatica, doći će do prelaza iz faze izbijanja stabila u fazu klasanja i same faze klasanja. Kod uljane repice, dominiraće faza cvetanja.

U aprilu, česte padavine stvoriće uslove za povećanje infektivnog potencijala brojnih gljivičnih bolesti u voćnjacima – uvenuća cvetova (rana smeđa trulež), parše, rupičavosti lišća, kovrdžavosti lišća breskve, i drugih. Pogodniji uslovi za izvođenje zaštitnih tretmana u voćnim kulturama javiće se tokom većeg broja dana prve i tokom prve polovine treće dekade.

Izvor: NIMH