

Система за контролу штеточина за лук

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2021 Брой: 5/2021



Štetnik – Lukina muva *Delia antiqua*

Šteta

Izležene larve se uvlače u bazu listova, proždiru hodnik u stabilu i prelaze u lukovicu. Oštećene biljke zaostaju u rastu, požute, poležu, lako se iščupaju i na kraju se osuše. Kao rezultat oštećenja, tkiva fermentišu i ispuštaju neprijatan miris pokvarenog luka.

Suzbijanje

Početak leta muva se očekuje u drugoj dekadi aprila. Zaražene biljke moraju se odmah ukloniti i uništiti. Prvu tretman treba sprovesti u periodu masovnog leta, koji se poklapa sa cvetanjem višnje. Prag ekonomske štete: 5 muva/10 zamaha entomološkom mrežom.

Štetnik – Duvanski trips *Thrips tabaci*

Šteta

Tripsi sišu sok iz listova i na njima se pojavljuju belkaste pege. Pri jakoj infestaciji pege se spajaju i ceo list pobele. Na pegama se mogu uočiti male crne tačkice – izmet štetočine.

Suzbijanje

U aprilu, pažnju treba posvetiti duvanskom tripsu od samog početka njegovog pojavljivanja, kada se seli sa biljnih ostataka ili korova na luk.

Štetnik – Plamenjača luka *Peronospora destructor*

Šteta

Na listovima se pojavljuju hlorotične do svetlozelene, eliptične pege, koje se, po vlažnom vremenu, prekrivaju ljubičastim sporulirajućim naborom. Povoljni uslovi za infekciju stvaraju se na temperaturama od 3–25 °C i prisustvu kapljica vode zadržanih na biljkama.

Suzbijanje

Iskorenjivanje samoniklih i primarno zaraženih biljaka. Po otkrivanju prvih pega bolesti, treba sprovesti vegetacione tretmane. U periodima suvog vremena, tretmani se mogu izvoditi rede.

Prilikom tretiranja useva luka, treba dodati adjuvant!