

Агрометеоролошка прогноза за јун

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2021 Брой: 6/2021



Tokom prve dekade juna, agrometeorološke uslove će odrediti nestabilno vreme. Na početku meseca predviđaju se značajne padavine i poboljšanje rezervi vlage u zemljištu u slojevima od 50 i 100 cm. U većem delu zemlje, rezerve vlage u zemljištu za prolećne useve će dostići nivo do, a u Podunavlju – čak i iznad 80-85% poljskog vodnog kapaciteta. Vlažnost zemljišta će ostati niža u nekim od istočnih i južnih regiona, gde su padavine u maju bile manje, na mestima ispod 50-60% mesečnih normi – G. Delčev, Sliven, Stara Zagora, Varna, Karnobat, Burgas, Ahtopol.

Na početku juna, razvoj poljoprivrednih useva će teći sporijim tempom, pod vremenskim uslovima koji su hladni za ovu godišnju dobu. Tokom prve dekade, kod pšenice će se odvijati nalivanje zrna i faza mlečne zrelosti. Krajem dekade, kod ječma na nekim mestima u južnim regionima, primećivaće se i voskana zrelost –

Sandanski. Pljuskovi će ograničiti mogućnosti za izvođenje tretmana zaštite biljaka protiv plamenjače na vinovoj lozi i povrtarskim kulturama, krastavosti i smeđe truleži na voćnim drvetima, i protiv štitastog smrdljivca na ozimim žitaricama. Tokom druge polovine perioda, verovatnoća za tuču i lokalne padavine ostaje, što predstavlja rizik od oštećenja poljoprivrednih useva. Rizik od poleganja useva pšenice i ječma je visok.

Tokom druge dekade, predviđa se poboljšanje i normalizacija temperaturnih uslova. U ovoj dekadi, ječam će završiti svoj razvoj. Kod uljane repice, javljaće se faza sazrevanja.

Tokom treće dekade, razvoj poljoprivrednih useva će teći na temperaturama bliskim klimatskim normama. U ovom periodu, kod pšenice u ravničarskim regionima, primećivaće se voskana zrelost.

Krajem juna, deo prolećnih useva će ući u reproduktivne faze svog razvoja. Kod ranih hibrida kukuruza, primećivaće se faza metličanja, a kod suncokreta posejanog u agrotehničkom roku – početak faze cvetanja.

Većinu dana u mesecu, visoka vlažnost vazduha će održavati povoljne uslove za razvoj brojnih gljivičnih oboljenja: krastavosti, šarke i pepelnice na voćnim drvetima; plamenjače na povrtarskim kulturama i vinovoj lozi, itd. Kod vinove loze, interfazni period od cvetanja cvatova do formiranja zametaka ploda veličine graška je kritičan za zarazu plamenjačom i pepelnicom (oidijumom). Prikladniji uslovi za izvođenje izuzetno važnih tretmana zaštite biljaka će se javiti tokom prve polovine druge i tokom treće dekade juna.

Tokom celog meseca, verovatnoća za tuču će ostati povećana. U slučaju oštećenja od tuče, preporučljivo je da se oštećeni voćni i povrtarski usevi tretiraju fungicidima na bazi bakra pri prvoj prilici.

Izvor: RHMZ