

# Крајем јуна – високе температуре и локалне падавине

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 29.06.2021 Брой: 6/2021



Krajem juna, agrometeorološke uslove će odrediti toplo, a na pojedinim mestima – vruće vreme. Razvoj poljoprivrednih useva na većini ratarskih površina će se odvijati pod dobrim i veoma dobrim zalihama vlage u slojevima zemljišta od 50 i 100 cm (preko 80–85% poljskog vodnog kapaciteta) kao rezultat obilnih padavina u protekle dve nedelje, koje su na pojedinim mestima u centralnoj i istočnoj Bugarskoj dostigle i premašile dvostruke jun ske norme (Veliko Trnovo – 118 l/m<sup>2</sup>, Ruše – 115 l/m<sup>2</sup>, Razgrad – 108 l/m<sup>2</sup>, Silistra – 116 l/m<sup>2</sup>, Dobrič – 111 l/m<sup>2</sup>, Karnobat – 96 l/m<sup>2</sup>). Izuzetak će se javiti u nekim krajnje zapadnim i južnim regionima, gde je zabeležen manjak padavina u odnosu na normalu, a zalihe vlage u zemljištu na početku leta su

nezadovoljavajuće za prolećne useve u sloju od 50 cm – ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke stanice: Bazovec, Kjustendil, Sandanski, Haskovo, Sliven).

U toku perioda, suncokret će biti u fazi formiranja cvasti. Početkom jula, u usevima posejanim u agrotehničkom roku, uglavnom u južnim regionima, primećuje se i početak faze cvetanja.

Kod kukuruza, nastaviće se formiranje listova. Kod ranijih hibrida, primećuje se faza metličanja i cvetanja metlice. Krajem juna i početkom jula, useve kukuruza treba pregledati na prisustvo jedne od najznačajnijih štetočina – kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*), a kada gustina štetočina pređe ekonomski prag štetnosti, neophodna je pravovremena zaštita.

Predviđene visoke temperature tokom poslednje nedelje juna će ograničiti razvoj brojnih gljivičnih oboljenja, sa izuzetkom pepelnica.

U narednom periodu, pšenica će završiti svoj razvoj čak i na višim poljima.

U toku perioda, ponovo se predviđaju lokalne padavine, sa povećanom verovatnoćom u istočnoj Bugarskoj, gde će početak žetve biti dodatno otežan.

*Izvor: NIMH*