

U julu – vruće i suvo vreme

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.07.2022 Брой: 7/2022*



Tokom druge dekade jula, na ratarskim površinama u zemlji nije zabeležena padavina od poljoprivrednog značaja. Ovo je produbilo deficit rezervi vlage u zemljištu u jednometarskom sloju u zapadnoj i južnoj centralnoj Bugarskoj.

Krajem jula, agrometeorološke uslove će odrediti vruće i suvo vreme. Temperature iznad normale sa maksimalnim vrednostima iznad 35°C, na pojedinim mestima dostižući i prelazeći 40°C, porešiće normalan tok fizioloških procesa i dovesti do skraćanja interfaznih perioda kod poljoprivrednih useva. Tokom perioda, u zavisnosti od dužine vegetacionog perioda pojedinačnih hibrida, kukuruz će biti u fazama metličanja, cvetanja, svilanja, formiranja zrna, a na nekim lokalitetima u Podunavskoj ravnici i u fazi mlečne zrelosti (agrometeorološke stanice Kneja, Novachene i Silistra).

Kod suncokreta, odvijaće se cvetanje, formiranje i naliwanje semena. Vruće i suvo vreme tokom perioda zahtevaće primenu povećanih norma za navodnjavanje povrtarskih kultura i kukuruza.

Tokom perioda, na mnogim mestima na ratarskim površinama, odsustvo vlage u oraničnom sloju otežaće i odložiti pravovremeno izvođenje sezonskih obrada zemljišta.

Kod višegodišnjih useva i povrtarskih kultura, nastavlja se tretiranje zaštitom bilja od bolesti i štetočina – protiv pepelnice i grozdane moljca u vinogradima, protiv pepelnice, voćnih crva i grinja u voćnim vrstama, i protiv pepelnice i grinja kod povrtarskih kultura. Prilikom hemijske zaštite, treba primenjivati proizvode sa kratkim periodom čekanja do berbe, tokom hladnijih sati u danu.

Izvor: NIMH