

Током септембра – добро ниво залиха влаге и погодни услови за обављање сезонских пољских радова

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.09.2022 Брой: 9/2022



Tokom prve polovine prve dekade septembra, agrometeorološki uslovi će ostati nestabilni, uz česte padavine koje će održavati dobre rezerve vlage u gornjim slojevima zemljišta na većini ratarskih površina. Brojne padavine koje su pale tokom treće dekade avgusta, premašivši u mnogim delovima zemlje 30-40 l/m² (Lom - 44 l/m², Oryahovo - 54 l/m², Knezha - 53 l/m², Plovdiv - 36 l/m², Kardzhali - 72 l/m², Chirpan - 67 l/m², Ahtopol - 60 l/m²), povećale su rezerve vlage u zemljištu u sloju od 50 cm. Ove padavine su bile kasne za deo jarih useva gajenih u uslovima prirodnog navodnjavanja, koji su, kao posledica deficita vlage u zemljištu, pre vremena završili vegetaciju.

Tokom prve i većeg dela dana druge dekade septembra, razvoj kasnih poljoprivrednih useva koji su prevazišli nepovoljne efekte letnje suše odvijaće se ubrzanim tempom, na temperaturama oko i iznad klimatskih normi. Početkom septembra, razvoj srednje kasnih hibrida kukuruza će biti završen. Kod kasnih hibrida, primećuje se faza mlečne zrelosti, a sredinom meseca – faza voštane zrelosti.

Početkom druge dekade, ponovo se predviđaju padavine i očekuje se povećan rizik od razvoja patogena koji izazivaju trulež zrelih i zrenih plodova i grožđa - siva plesan na grožđu, kasna smeđa trulež na plodovima jesenje-zimskih sorti voćaka.

Tokom meseca, periodi sa relativno suvim vremenom i povoljnijim uslovima za obavljanje sezonskih ratarskih radova: žetvu suncokreta i ranijih hibrida kukuruza, izvođenje duboke oranja i predsetvene pripreme površina predviđenih za setvu ozimih useva, i setvu ozime uljane repice, očekuju se tokom druge polovine prve i većeg dela dana druge dekade. Do kraja druge dekade septembra, važiće agrotehnički optimalni vremenski rokovi za setvu uljane repice.

Tokom treće dekade septembra, predviđa se stabilizacija vremena, značajno sniženje temperatura i prelazne promene u agrometeorološkim uslovima tipične za kraj leta i početak jeseni. Očekivane padavine u ovom periodu obezbediće vlagu za normalno nicanje useva ozime uljane repice posejanih u agrotehničkim rokovima.

U fazi nicanja, štetu na uljanoj repici nanose lisna buva kupusnjača (odrasli primerci) i repičina pilica (lažne gusenice), što zahteva da se nicali usevi prate na prisustvo ovih štetočina i, kada njihova gustina pređe prag ekonomske štete (PES za lisnu buvu kupusnjaču - 2 jedinke po m²; PES za repičinu pilicu - 2-3 lažne gusenice po m²), izvrši pravovremena zaštita.

Do kraja septembra na ratarskim površinama se ne predviđaju mrazevi, što će obezbediti uslove za formiranje dodatne proizvodnje od povrtarskih kultura kasne ratarske proizvodnje.

Izvor RHMZ