


Krajem septembra i početkom oktobra, uslovi će biti povoljni za razvoj patogena koji izazivaju trulež u neubranom usevu.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 25.09.2022 Брой: 9/2022



U septembru su na pojedinim mestima u južnim regionima (Haskovo, Pazardžik, Čirpan, Karnobat, Plovdiv, Sandanski, Sliven, Burgas) pali ekonomski značajni padavine od 15–20 l/m² i obezbedili neophodnu vlažnost za nicanje ozimog uljane repice posejane u agrotehničkom roku.

Predviđeno je poboljšanje agrometeoroloških uslova krajem meseca. U tom periodu, kasni hibridi kukuruza će završiti svoj razvoj i ući ću u punu zrelost. Kod kasnih sorti voćaka i vinograda, procesi zrenja će se odvijati na temperaturama oko klimatskih normi.

U toku perioda ne očekuju se značajne padavine i uslovi će omogućiti završetak žetve kasnih jarih useva, izvođenje predsetvene obrade zemljišta na površinama predviđenim za setvu pšenice i ječma, i primenu mineralnih đubriva. U ovom periodu počinje agrotehnički rok za setvu ozimih žitarica na visokim poljima i Predbalkanu. Do kraja septembra, uslovi će omogućiti nadoknadu zakašnjenja u setvi ozime uljane repice. Period je pogodan za jesenju setvu spanaća i za podizanje novih zasada jagode.

Na početku perioda, na izolovanim mestima u kotlinskim poljima, ne može se isključiti mogućnost stvaranja mraza, što zahteva blagovremenu berbu proizvoda osetljivih na oštećenje od mraza.

U prvoj nedelji oktobra, agrometeorološki uslovi će biti određeni nestabilnim vremenom, a u drugoj polovini perioda – i temperaturama ispod normale. Predviđene padavine u prvoj nedelji oktobra će odložiti čišćenje površina od kasnih redovnih useva. Vlažno i prohladno vreme sredinom prve dekade biće preduslov za razvoj patogena koji izazivaju trulež – sivu plesan na neubranom urodu kasnijih sorti vinove loze za vino, i kasnu braon trulež na plodovima jesenje-zimskih sorti voćaka.

Padavine koje su pale krajem septembra u severozapadnim regionima, u delu severoistočnih regiona i na sočanskom polju, u opsegu od 20–30 l/m² (N. selo, Vidin, Lom, Orahovo, Sofija, V. Trnovo, Dobrič), povećale su rezerve vlage u gornjim slojevima zemljišta. U narednom periodu, u zapadnoj Bugarskoj i centralnim regionima, ponovo se predviđa verovatnoća lokalnih, intenzivnih padavina, što će ometati sprovođenje predsetvene obrade na površinama predviđenim za setvu jesenjih useva. Očekuju se ozbiljna zakašnjenja u setvi ozime uljane repice. Nepovoljni agrometeorološki uslovi na kraju leta i početkom jeseni, suša i naknadne intenzivne padavine, razlog su što su na mnogim mestima u ravničarskim regionima propušteni agrotehnički rokovi u septembru za setvu uljane repice – useva koji zahteva preciznu agrotehniku. Početkom oktobra počinje agrotehnički rok za setvu pšenice u severnoj Bugarskoj.

Izvor: NIMH