

Агрометеоролошка прогноза за октобар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



U oktobru će agrometeorološki uslovi biti dinamični, sa temperaturama blizu klimatskih normi i padavinama iznad mesečnih normi.

Tokom prvih dana oktobra predviđene su temperature iznad uobičajenih za ovu sezonu, što stvara uslove za formiranje dodatnog prinosa od kasnih povrtarskih kultura, kao i za povećanje sadržaja šećera u plodovima jesenjih sorti voćaka i kasnih sorti vinove loze.

Nakon temperatura iznad normale, predviđeno je kratkotrajno zahlađenje i normalizacija termalnih uslova tokom druge polovine prve dekade.

Tokom prve dekade oktobra očekuju se značajne padavine, koje će dodatno otežati sezonske agrotehničke aktivnosti. Bolji uslovi za izvođenje predsetvene obrade zemljišta i setve ozimih useva očekuju se tokom prve polovine druge i tokom većine dana treće dekade.

Suša i naknadne značajne, mestimično obilne, padavine krajem leta i početkom jeseni bile su razlog propuštanja optimalnih rokova setve u septembru za ozimu uljanu repicu. Značajan deo planiranih površina biće posejan u oktobru, nakon agrotehničkih rokova. Zbog ovih objektivnih razloga, postoji verovatnoća da kasno posejani usevi uljane repice neće uspeti da formiraju rozetu (7–8 listova) tokom svoje jesenje vegetacije – faze u kojoj biljke uspešno prezimljavaju.

Oktobar je optimalan period za setvu ozimih žitara. Tokom prve dekade je agrotehnički rok za setvu pšenice u Severnoj Bugarskoj, od 15. do 25. oktobra – u Južnoj Bugarskoj, a krajem meseca – u područjima duž crnomorske obale.

Tokom meseca, početne faze vegetacije posejanih ozimih useva će se odvijati umerenim tempom, s obzirom na prisustvo dobrih rezervi vlage u gornjim slojevima zemljišta. Krajem oktobra, kod pšenice, u zavisnosti od rokova setve, primećivaće se nicanje i faza trećeg lista. U najranije posejanim usevima, krajem septembra i početkom oktobra, primećivaće se i početak faze busanja. Kod uljane repice će dominirati formiranje listova.

Predviđeni termalni uslovi u oktobru, bliski normi, preduslov su za povećanje populacije obične voluharice – jedne od opasnih štetočina u ozimim usevima. Do kraja meseca, ozimi usevi moraju se pregledati na prisustvo štetočine, a ako njena gustina pređe ekonomski prag štetnosti (2 aktivne kolonije po dekaru), neophodne su pravovremene mere zaštite bilja (otrovane mamke postavljene na ulazima u kolonije).

Krajem oktobra, uslovi će omogućiti sprovođenje određenih fitosanitarnih aktivnosti u voćnjacima. Jabučnjaci i krušnjaci zahvaćeni parom, posle berbe, moraju se tretirati 5% rastvorom uree da bi se infekcija smanjila. Kod koštičavog voća, nakon masovnog opadanja listova, preporučuje se prskanje 2% bordo smesom protiv uzročnika rupičavosti listova, rane smeđe truleži i kovrdžavosti lista breskve.

Izvor: NIMH